

Exploitation : formatioj  
 Parcelle : test 4  
 Type de sol : Non renseigné

**Commentaires :**

  


**Adventices étudiées :**

Adventices :	Risque :
Chénopode	54
Matricaire	64
Mouron	74
Ray-grass	17

**Situation initiale :**

**Année 1 - Maïs**

<b>Date de semis</b> Avr-d3	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Très faible	<b>Interculture</b> Avr-d2 50%	<b>Date de labour</b> Pas de labour	<b>Densité de semis</b> 12 gr/m <sup>2</sup>
Chénopode 62	Chénopode 0	Chénopode -3	Chénopode 0	Chénopode 0
Matricaire 42	Matricaire 0	Matricaire -2	Matricaire 0	Matricaire 0
Mouron 102	Mouron 0	Mouron -4	Mouron 0	Mouron 0
Ray-grass 12	Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0
<b>Entre rangs</b> 42 cm	<b>Variété</b> Non couvrante	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b>
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 57
Matricaire -2	Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire 38
Mouron -2	Mouron 0	Mouron 0		Mouron 96
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 9

## Année 2 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Très faible	Avr-d2 50%	Pas de labour	12 gr/m <sup>2</sup>
Chénopode	62	Chénopode	-3	Chénopode
Matricaire	42	Matricaire	-2	Matricaire
Mouron	102	Mouron	-4	Mouron
Ray-grass	12	Ray-grass	-2	Ray-grass

  

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Chénopode	-2	Chénopode	0	Chénopode
Matricaire	-2	Matricaire	0	Matricaire
Mouron	-2	Mouron	0	Mouron
Ray-grass	-2	Ray-grass	0	Ray-grass

## Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Oct-d1 50%	Pas de labour	250 gr/m <sup>2</sup>
Chénopode	8	Chénopode	-1	Chénopode
Matricaire	26	Matricaire	-1	Matricaire
Mouron	2	Mouron	0	Mouron
Ray-grass	35	Ray-grass	-4	Ray-grass

  

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
18 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Chénopode	0	Chénopode	0	Chénopode
Matricaire	0	Matricaire	0	Matricaire
Mouron	0	Mouron	0	Mouron
Ray-grass	0	Ray-grass	0	Ray-grass

## Année 4 - Autre culture d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Très faible	Oct-d1 50%	Pas de labour	12 gr/m <sup>2</sup>
Chénopode 2	Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0
Matricaire 20	Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0
Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0
Ray-grass 31	Ray-grass 0	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0

  

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 1
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire 19
Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0		Mouron 0
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 27