

Exploitation :
Parcelle :
Type de sol :

GROUPE2
1
Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

| Adventices : | Risque : | |
|-------------------|----------|--|
| Datura stramoine | 18 | |
| Panic pied-de-coq | 14 | |
| Sétaire verte | 15 | |
| Chénopode | 23 | |

Situation initiale :

Année 1 - Féverole d'hiver

| | | | | |
|---|---|---|---|--|
| Date de semis Nov-d2 Datura stramoine 0 Panic pied-de-coq 0 Sétaire verte 0 Chénopode 0 | Étouffement culture Association de cultures : Très faible Datura stramoine 0 Panic pied-de-coq 0 Sétaire verte 0 Chénopode 0 | Interculture Nov-d2 50% Oct-d3 50% Sep-d3 50% Datura stramoine -1 Panic pied-de-coq -1 Sétaire verte -1 Chénopode -2 | Date de labour Non définie Datura stramoine 0 Panic pied-de-coq 0 Sétaire verte 0 Chénopode 0 | Densité de semis 12 gr/m² Datura stramoine 0 Panic pied-de-coq 0 Sétaire verte 0 Chénopode 0 |
| Entre rangs 42 cm Datura stramoine 0 Panic pied-de-coq 0 Sétaire verte 0 Chénopode 0 | Variété Non couvrante Datura stramoine 0 Panic pied-de-coq 0 Sétaire verte 0 Chénopode 0 | Désherbage mécanique Bineuse : Mar-d2 Houe rotative : Herse étrille : Nov-d3 Jan-d3 Datura stramoine 0 Panic pied-de-coq 0 Sétaire verte 0 Chénopode -3 | Désherbage chimique | Score annuel Datura stramoine 0 Panic pied-de-coq 0 Sétaire verte 0 Chénopode 0 |

Année 2 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|------------------------|-------------------------------------|--|------------------------|------------------------|
| Nov-d2 | Association de cultures : Faible | Jul-d2 50% Oct-d2 50% Nov-d3 50% | Non définie | 350 gr/m² |
| Datura stramoine 0 | Datura stramoine -4 | Datura stramoine -5 | Datura stramoine 0 | Datura stramoine 0 |
| Panic pied-de-coq 0 | Panic pied-de-coq -4 | Panic pied-de-coq -5 | Panic pied-de-coq 0 | Panic pied-de-coq 0 |
| Sétaire verte 0 | Sétaire verte -4 | Sétaire verte -5 | Sétaire verte 0 | Sétaire verte 0 |
| Chénopode 6 | Chénopode -4 | Chénopode -2 | Chénopode 0 | Chénopode 0 |

| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
|------------------------|-------------------------|---|---------------------|------------------------|
| 17.5 cm | Moyennement couvrante | Bineuse : Houe rotative : Jan-d2 Mar-d2 Herse étrille : Nov-d2 Fév-d2 | | |
| Datura stramoine 0 | Datura stramoine -1 | Datura stramoine 0 | | Datura stramoine 0 |
| Panic pied-de-coq 0 | Panic pied-de-coq -1 | Panic pied-de-coq 0 | | Panic pied-de-coq 0 |
| Sétaire verte 0 | Sétaire verte -1 | Sétaire verte 0 | | Sétaire verte 0 |
| Chénopode 0 | Chénopode -1 | Chénopode -3 | | Chénopode 0 |

Année 3 - Tournesol

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|-------------------------|--|--|-------------------------|------------------------|
| Mai-d1 | Association de cultures : Très faible | Jul-d2 50% Oct-d2 50% Mar-d2 50% Sep-d1 50% Fév-d2 50% Avr-d2 50% | Jan-d1 | 12 gr/m² |
| Datura stramoine 58 | Datura stramoine 0 | Datura stramoine -7 | Datura stramoine -2 | Datura stramoine 0 |
| Panic pied-de-coq 58 | Panic pied-de-coq 0 | Panic pied-de-coq -7 | Panic pied-de-coq -2 | Panic pied-de-coq 0 |
| Sétaire verte 58 | Sétaire verte 0 | Sétaire verte -7 | Sétaire verte -2 | Sétaire verte 0 |
| Chénopode 52 | Chénopode 0 | Chénopode -11 | Chénopode -1 | Chénopode 0 |

| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
|------------------------|------------------------|---|---------------------|-------------------------|
| 42 cm | Non couvrante | Bineuse : Jun-d1 Jun-d3 Houe rotative : Herse étrille : Mai-d2 | | |
| Datura stramoine 0 | Datura stramoine 0 | Datura stramoine -7 | | Datura stramoine 42 |
| Panic pied-de-coq 0 | Panic pied-de-coq 0 | Panic pied-de-coq -7 | | Panic pied-de-coq 42 |
| Sétaire verte 0 | Sétaire verte 0 | Sétaire verte -7 | | Sétaire verte 42 |
| Chénopode 0 | Chénopode 0 | Chénopode -5 | | Chénopode 35 |