

Exploitation : Marc MABIRE
Parcelle : 1
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Brome mou	45	
Vulpin	42	
Matricaire	59	
Gaillet	39	
Ray-grass	43	

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Août-d3	Association de cultures : Moyen	Août-d1 50%	Pas de labour	12 gr/m²
Brome mou 105	Brome mou -6	Brome mou -1	Brome mou 0	Brome mou 0
Vulpin 89	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Matricaire 30	Matricaire -6	Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0
Gaillet 25	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Ray-grass 96	Ray-grass -6	Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0		Brome mou 96
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 81
Matricaire -2	Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire 21
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 17
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 86

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Aoû-d1 50% Sep-d2 50%	Pas de labour	260 gr/m ²
Brome mou 71	Brome mou -4	Brome mou -6	Brome mou 0	Brome mou 0
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -5	Vulpin 0	Vulpin 0
Matricaire 29	Matricaire -4	Matricaire -3	Matricaire 0	Matricaire 0
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass -7	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Brome mou 61
Brome mou 0	Brome mou 0	Brome mou 0		Vulpin 51
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Matricaire 23
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		Gaillet 92
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Ray-grass 41
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		

Année 3 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Aoû-d1 50%	Déc-d1	12 gr/m ²
Brome mou 11	Brome mou 0	Brome mou -1	Brome mou -2	Brome mou 0
Vulpin 21	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -2	Vulpin 0
Matricaire 42	Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire -1	Matricaire 0
Gaillet 2	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -3	Gaillet 0
Ray-grass 19	Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass -2	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Brome mou 8
Brome mou 0	Brome mou 0	Brome mou 0		Vulpin 19
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Matricaire 40
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		Gaillet 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Ray-grass 16
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis

Oct-d2

Brome mou	71
Vulpin	60
Matricaire	29
Gaillet	97
Ray-grass	52

Étouffement culture

Association de cultures :
Faible

Brome mou	-4
Vulpin	-4
Matricaire	-4
Gaillet	-4
Ray-grass	-4

Interculture

Août-d1 50% Sep-d2 50%

Brome mou	-6
Vulpin	-5
Matricaire	-3
Gaillet	-1
Ray-grass	-7

Date de labour

Pas de labour

Brome mou	0
Vulpin	0
Matricaire	0
Gaillet	0
Ray-grass	0

Densité de semis

260 gr/m²

Brome mou	0
Vulpin	0
Matricaire	0
Gaillet	0
Ray-grass	0

Entre rangs

17 cm

Brome mou	0
Vulpin	0
Matricaire	0
Gaillet	0
Ray-grass	0

Variété

Non couvrante

Brome mou	0
Vulpin	0
Matricaire	0
Gaillet	0
Ray-grass	0

Désherbage mécanique

Bineuse :
Houe rotative :
Herse étrille :

Brome mou	0
Vulpin	0
Matricaire	0
Gaillet	0
Ray-grass	0

Désherbage chimique

Score annuel

Brome mou	61
Vulpin	51
Matricaire	23
Gaillet	92
Ray-grass	41