

Exploitation : Non renseigné
 Parcelle : esperance
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :


Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	26
Chénopode	60
Morelle	21
Renouée persicaire	67
Matricaire	71


Situation initiale :
Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis Oct-d2	Étouffement culture Association de cultures : Faible	Interculture Aoû-d2 50% Sep-d1 50%	Date de labour Oct-d2	Densité de semis 300 gr/m ²
Vulpin 60 Chénopode 11 Morelle 0 Renouée persicaire 0 Matricaire 29	Vulpin -4 Chénopode -4 Morelle -4 Renouée persicaire -4 Matricaire -4	Vulpin -5 Chénopode -3 Morelle -5 Renouée persicaire 0 Matricaire -3	Vulpin -4 Chénopode -1 Morelle -1 Renouée persicaire -1 Matricaire -1	Vulpin 0 Chénopode 0 Morelle 0 Renouée persicaire 0 Matricaire 0
Entre rangs 12.5 cm	Variété Non couvrante	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Désherbage chimique	Score annuel
Vulpin -2 Chénopode -2 Morelle -2 Renouée persicaire -2 Matricaire -2	Vulpin 0 Chénopode 0 Morelle 0 Renouée persicaire 0 Matricaire 0	Vulpin 0 Chénopode 0 Morelle 0 Renouée persicaire 0 Matricaire 0		Vulpin 45 Chénopode 1 Morelle 0 Renouée persicaire 0 Matricaire 20

Année 2 - Maïs



Année 3 - Blé d'hiver



Année 4 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Vulpin 0 Chénopode 0 Morelle 0 Renouée persicaire 0 Matricaire 0	Vulpin -3 Chénopode -1 Morelle -1 Renouée persicaire -2 Matricaire -1	12 gr/m ² Vulpin 0 Chénopode 0 Morelle 0 Renouée persicaire 0 Matricaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 17 Chénopode 65 Morelle 34 Renouée persicaire 132 Matricaire 43
Vulpin 21 Chénopode 68 Morelle 36 Renouée persicaire 136 Matricaire 46	Vulpin 0 Chénopode 0 Morelle 0 Renouée persicaire 0 Matricaire 0	Vulpin 0 Chénopode 0 Morelle 0 Renouée persicaire 0 Matricaire 0		