

Scénario : actuel  
Exploitation : earl picart  
Parcelle : les 40  
Type de sol : limon

Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Matricaire	50 ( 50)	
Chénopode	30 ( 30)	
Mercuriale	19 ( 19)	
Folle-avoine	16 ( 16)	
Vulpin	22 ( 22)	

### Scénario :

#### Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Sep-d2 50%   Aoû-d2 50%	Pas de labour	150 gr/m²
Matricaire 29	Matricaire -4	Matricaire -3	Matricaire 0	Matricaire 0
Chénopode 11	Chénopode -4	Chénopode -3	Chénopode 0	Chénopode 0
Mercuriale 26	Mercuriale -4	Mercuriale -0	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Folle-avoine 26	Folle-avoine -4	Folle-avoine -2	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0

  

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
13 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Mar-d2 Herse étrille :	Avr-d3	
Matricaire -2	Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire 21
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 2
Mercuriale -2	Mercuriale 0	Mercuriale 0		Mercuriale 20
Folle-avoine -2	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Folle-avoine 18
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 48

## Année 2 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Très faible	Août-d2 50% Sep-d2 50%	Nov-d3	12 gr/m <sup>2</sup>
Matricaire 47	Matricaire 0	Matricaire -3	Matricaire -1	Matricaire 0
Chénopode 66	Chénopode 0	Chénopode -3	Chénopode -1	Chénopode 0
Mercuriale 50	Mercuriale 0	Mercuriale -0	Mercuriale -1	Mercuriale 0
Folle-avoine 81	Folle-avoine 0	Folle-avoine -2	Folle-avoine -2	Folle-avoine 0
Vulpin 35	Vulpin 0	Vulpin -6	Vulpin -2	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Mai-d1 Avr-d3 Herse étrille :	Mai-d3 Avr-d2 Mai-d2	Matricaire 40
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire -4		Chénopode 56
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -6		Mercuriale 39
Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale -9		Folle-avoine 72
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine -6		Vulpin 25
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -2		

## Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Faible		Pas de labour	200 gr/m <sup>2</sup>
Matricaire 21	Matricaire -4	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0
Chénopode 6	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Mercuriale 3	Mercuriale -4	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Folle-avoine 13	Folle-avoine -4	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Vulpin 8	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
13 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Mar-d2 Herse étrille :	Avr-d3	Matricaire 13
Matricaire -2	Matricaire 0	Matricaire -2		Chénopode 0
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode -3		Mercuriale 0
Mercuriale -2	Mercuriale 0	Mercuriale 0		Folle-avoine 2
Folle-avoine -2	Folle-avoine 0	Folle-avoine -5		Vulpin 0
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin -2		

## Année 4 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Août-d3	Association de cultures : Moyen	Sep-d2 50% Août-d2 50%	Pas de labour	12 gr/m²
Matricaire 30	Matricaire -6	Matricaire -3	Matricaire 0	Matricaire 0
Chénopode 31	Chénopode -6	Chénopode -3	Chénopode 0	Chénopode 0
Mercuriale 10	Mercuriale -6	Mercuriale -0	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Folle-avoine 28	Folle-avoine -6	Folle-avoine -2	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Vulpin 89	Vulpin -6	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
13 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Sep-d2 Herse étrille :	Août-d3	Matricaire 18
Matricaire -2	Matricaire 0	Matricaire -1		Chénopode 18
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode -2		Mercuriale 1
Mercuriale -2	Mercuriale 0	Mercuriale -0		Folle-avoine 16
Folle-avoine -2	Folle-avoine 0	Folle-avoine -2		Vulpin 69
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin -5		

## Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Sep-d2 50% Août-d2 50%	Pas de labour	150 gr/m²
Matricaire 29	Matricaire -4	Matricaire -3	Matricaire 0	Matricaire 0
Chénopode 11	Chénopode -4	Chénopode -3	Chénopode 0	Chénopode 0
Mercuriale 26	Mercuriale -4	Mercuriale -0	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Folle-avoine 26	Folle-avoine -4	Folle-avoine -2	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
13 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Mar-d2 Herse étrille :	Avr-d3	Matricaire 21
Matricaire -2	Matricaire 0	Matricaire 0		Chénopode 2
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0		Mercuriale 20
Mercuriale -2	Mercuriale 0	Mercuriale 0		Folle-avoine 18
Folle-avoine -2	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Vulpin 48
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		

Année 6 - Pois d'hiver

Date de semis

Nov-d2

Matricaire	15
Chénopode	0
Mercuriale	3
Folle-avoine	0
Vulpin	4

Étouffement culture

Association de cultures :  
Très faible

Matricaire	0
Chénopode	0
Mercuriale	0
Folle-avoine	0
Vulpin	0

Interculture

Aoû-d2 50%    Sep-d2 50%

Matricaire	-3
Chénopode	-3
Mercuriale	-0
Folle-avoine	-2
Vulpin	-6

Date de labour

Pas de labour

Matricaire	0
Chénopode	0
Mercuriale	0
Folle-avoine	0
Vulpin	0

Densité de semis

12 gr/m²

Matricaire	0
Chénopode	0
Mercuriale	0
Folle-avoine	0
Vulpin	0

Entre rangs

42 cm

Matricaire	0
Chénopode	0
Mercuriale	0
Folle-avoine	0
Vulpin	0

Variété

Non couvrante

Matricaire	0
Chénopode	0
Mercuriale	0
Folle-avoine	0
Vulpin	0

Désherbage mécanique

Bineuse :  
Houe rotative :  
Herse étrille :

Matricaire	0
Chénopode	0
Mercuriale	0
Folle-avoine	0
Vulpin	0

Désherbage chimique

Mar-d1

Score annuel

Matricaire	12
Chénopode	0
Mercuriale	3
Folle-avoine	0
Vulpin	0