

Exploitation : Non renseigné
 Parcelle : 77
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

| Adventices : | Risque : |
|---------------------|----------|
| Arroche | 67 |
| Mouron | 56 |
| Renouée des oiseaux | 65 |
| Chénopode | 58 |
| Ray-grass | 16 |

Situation initiale :

Année 1 - Betteraves

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|-------------------------|--|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| Avr-d2 | Association de cultures : Très faible | Aoû-d1 50% Sep-d1 50% | Nov-d2 | 12 gr/m ² |
| Arroche 99 | Arroche 0 | Arroche 0 | Arroche -1 | Arroche 0 |
| Mouron 91 | Mouron 0 | Mouron -2 | Mouron -1 | Mouron 0 |
| Renouée des oiseaux 110 | Renouée des oiseaux 0 | Renouée des oiseaux 0 | Renouée des oiseaux -2 | Renouée des oiseaux 0 |
| Chénopode 63 | Chénopode 0 | Chénopode -3 | Chénopode -1 | Chénopode 0 |
| Ray-grass 19 | Ray-grass 0 | Ray-grass -7 | Ray-grass -4 | Ray-grass 0 |

| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------|
| 42 cm | Non couvrante | Bineuse : Mai-d2 | | Arroche 94 |
| Arroche 0 | Arroche 0 | Houe rotative : Herse étrille : | | Mouron 83 |
| Mouron 0 | Mouron 0 | Arroche -4 | | Renouée des oiseaux 105 |
| Renouée des oiseaux 0 | Renouée des oiseaux 0 | Mouron -5 | | Chénopode 55 |
| Chénopode 0 | Chénopode 0 | Renouée des oiseaux -4 | | Ray-grass 9 |
| Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | Chénopode -3 | | |
| | | Ray-grass -0 | | |

Année 2 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|------------------------|----------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| Oct-d3 | Association de cultures : Faible | Oct-d3 50% | Pas de labour | 350 gr/m ² |
| Arroche 12 | Arroche -4 | Arroche 0 | Arroche 0 | Arroche 0 |
| Mouron 2 | Mouron -4 | Mouron 0 | Mouron 0 | Mouron 0 |
| Renouée des oiseaux 9 | Renouée des oiseaux -4 | Renouée des oiseaux 0 | Renouée des oiseaux 0 | Renouée des oiseaux 0 |
| Chénopode 8 | Chénopode -4 | Chénopode -0 | Chénopode 0 | Chénopode 0 |
| Ray-grass 35 | Ray-grass -4 | Ray-grass -3 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 15 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | | |
| Arroche -1 | Arroche 0 | Arroche 0 | | Arroche 7 |
| Mouron -1 | Mouron 0 | Mouron 0 | | Mouron 0 |
| Renouée des oiseaux -1 | Renouée des oiseaux 0 | Renouée des oiseaux 0 | | Renouée des oiseaux 4 |
| Chénopode -1 | Chénopode 0 | Chénopode 0 | | Chénopode 3 |
| Ray-grass -1 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | | Ray-grass 27 |

Année 3 - Orge de printemps

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|-------------------------|--------------------------------|---|------------------------|------------------------|
| Mar-d1 | Association de cultures : Fort | Aoû-d1 50% Sep-d1 50% | Nov-d2 | 250 gr/m ² |
| Arroche 109 | Arroche -10 | Arroche 0 | Arroche -1 | Arroche 0 |
| Mouron 38 | Mouron -10 | Mouron -2 | Mouron -1 | Mouron 0 |
| Renouée des oiseaux 106 | Renouée des oiseaux -10 | Renouée des oiseaux 0 | Renouée des oiseaux -2 | Renouée des oiseaux 0 |
| Chénopode 58 | Chénopode -10 | Chénopode -3 | Chénopode -1 | Chénopode 0 |
| Ray-grass 33 | Ray-grass -10 | Ray-grass -7 | Ray-grass -4 | Ray-grass 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 42 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | | |
| Arroche 0 | Arroche 0 | Arroche 0 | | Arroche 98 |
| Mouron 0 | Mouron 0 | Mouron 0 | | Mouron 25 |
| Renouée des oiseaux 0 | Renouée des oiseaux 0 | Renouée des oiseaux 0 | | Renouée des oiseaux 94 |
| Chénopode 0 | Chénopode 0 | Chénopode 0 | | Chénopode 43 |
| Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | | Ray-grass 13 |