

Scénario : 1
 Exploitation : Sc4
 Parcelle : 3bruy
 Type de sol : limons profonds

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Chénopode	52 (46)
Mercuriale	40 (43)
Vulpin	14 (23)
Agrostis	24 (24)
Gaillet	25 (28)

Scénario :
Année 1 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Très faible	Fév-d1 50% Mar-d1 50% Mar-d3 50% Aoû-d1 50%	Fév-d1	12 gr/m ²
Chénopode 66	Chénopode 0	Chénopode -7	Chénopode -1	Chénopode 0
Mercuriale 50	Mercuriale 0	Mercuriale -1	Mercuriale -2	Mercuriale 0
Vulpin 35	Vulpin 0	Vulpin -4	Vulpin -5	Vulpin 0
Agrostis 9	Agrostis 0	Agrostis -8	Agrostis -3	Agrostis 0
Gaillet 4	Gaillet 0	Gaillet -3	Gaillet -5	Gaillet 0
Entre rangs				
42 cm	Non couvrante	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Chénopode 0	Chénopode 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Chénopode 58
Mercuriale 0	Mercuriale 0	Chénopode 0		Mercuriale 47
Vulpin 0	Vulpin 0	Mercuriale 0		Vulpin 26
Agrostis 0	Agrostis 0	Vulpin 0		Agrostis 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Agrostis 0		Gaillet 0

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Oct-d2 50%	Pas de labour	180 gr/m ²
Chénopode 8	Chénopode -4	Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0
Mercuriale 18	Mercuriale -4	Mercuriale -2	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -5	Vulpin 0	Vulpin 0
Agrostis 40	Agrostis -4	Agrostis -1	Agrostis 0	Agrostis 0
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet -5	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0		Chénopode 3
Mercuriale 0	Mercuriale -1	Mercuriale 0		Mercuriale 11
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0		Vulpin 25
Agrostis 0	Agrostis -1	Agrostis 0		Agrostis 34
Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet 0		Gaillet 84

Année 3 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d1	Association de cultures : Fort	Mar-d1 50% Aoû-d1 50% Fév-d1 50%	Fév-d1	230 gr/m ²
Chénopode 58	Chénopode -10	Chénopode -4	Chénopode -1	Chénopode 0
Mercuriale 16	Mercuriale -10	Mercuriale 0	Mercuriale -2	Mercuriale 0
Vulpin 36	Vulpin -10	Vulpin -2	Vulpin -5	Vulpin 0
Agrostis 28	Agrostis -10	Agrostis -7	Agrostis -3	Agrostis 0
Gaillet 9	Gaillet -10	Gaillet -2	Gaillet -5	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 43
Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0		Mercuriale 4
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 19
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0		Agrostis 8
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 0

Année 4 - Pois d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Très faible	Oct-d3 50% Aoû-d1 50%	Oct-d3	12 gr/m ²
Chénopode	0	Chénopode	-2	Chénopode
Mercuriale	9	Mercuriale	-2	Mercuriale
Vulpin	11	Vulpin	-4	Vulpin
Agrostis	38	Agrostis	-1	Agrostis
Gaillet	82	Gaillet	-5	Gaillet
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Chénopode	0	Chénopode	0	Chénopode
Mercuriale	0	Mercuriale	0	Mercuriale
Vulpin	0	Vulpin	0	Vulpin
Agrostis	0	Agrostis	0	Agrostis
Gaillet	0	Gaillet	0	Gaillet

Année 5 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Avr-d1 50% Aoû-d1 50% Mar-d3 50% Avr-d2 50%	Déc-d1	12 gr/m ²
Chénopode	68	Chénopode	-11	Chénopode
Mercuriale	101	Mercuriale	-5	Mercuriale
Vulpin	21	Vulpin	-6	Vulpin
Agrostis	1	Agrostis	-2	Agrostis
Gaillet	2	Gaillet	-1	Gaillet
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Chénopode	0	Chénopode	0	Chénopode
Mercuriale	0	Mercuriale	0	Mercuriale
Vulpin	0	Vulpin	0	Vulpin
Agrostis	0	Agrostis	0	Agrostis
Gaillet	0	Gaillet	0	Gaillet

Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Oct-d2 50%	Pas de labour	180 gr/m ²
Chénopode 8	Chénopode -4	Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0
Mercuriale 18	Mercuriale -4	Mercuriale -2	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -5	Vulpin 0	Vulpin 0
Agrostis 40	Agrostis -4	Agrostis -1	Agrostis 0	Agrostis 0
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet -5	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0		Chénopode 3
Mercuriale 0	Mercuriale -1	Mercuriale 0		Mercuriale 11
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0		Vulpin 25
Agrostis 0	Agrostis -1	Agrostis 0		Agrostis 34
Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet 0		Gaillet 84