

Scénario : 1
 Exploitation : Sc4
 Parcelle : 2bruy
 Type de sol : limons profonds

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Chénopode	50 (62)
Mercuriale	18 (22)
Vulpin	23 (34)
Agrostis	25 (21)
Gaillet	18 (19)

Scénario :
Année 1 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Fév-d3	Association de cultures : Très faible	Fév-d1 50% Aoû-d1 50% Fév-d3 50%	Déc-d1	12 gr/m ²
Chénopode 49	Chénopode 0	Chénopode -3	Chénopode -1	Chénopode 0
Mercuriale 7	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale -2	Mercuriale 0
Vulpin 30	Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin -4	Vulpin 0
Agrostis 43	Agrostis 0	Agrostis -8	Agrostis -3	Agrostis 0
Gaillet 14	Gaillet 0	Gaillet -3	Gaillet -7	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 44
Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0		Mercuriale 5
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 24
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0		Agrostis 33
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 4

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Oct-d2 50% Aoû-d1 50%	Oct-d2	180 gr/m ²
Chénopode 8	Chénopode -4	Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode 0
Mercuriale 18	Mercuriale -4	Mercuriale -2	Mercuriale -2	Mercuriale 0
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -5	Vulpin -8	Vulpin 0
Agrostis 40	Agrostis -4	Agrostis -1	Agrostis -2	Agrostis 0
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet -5	Gaillet -8	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Chénopode -1	Chénopode -1	Chénopode 0		Chénopode 0
Mercuriale -1	Mercuriale -1	Mercuriale 0		Mercuriale 7
Vulpin -1	Vulpin -1	Vulpin 0		Vulpin 16
Agrostis -1	Agrostis -1	Agrostis 0		Agrostis 30
Gaillet -1	Gaillet -1	Gaillet 0		Gaillet 75

Année 3 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Fév-d3	Association de cultures : Fort	Fév-d3 50% Fév-d1 50% Aoû-d1 50%	Fév-d1	230 gr/m ²
Chénopode 49	Chénopode -10	Chénopode -3	Chénopode -1	Chénopode 0
Mercuriale 7	Mercuriale -10	Mercuriale 0	Mercuriale -2	Mercuriale 0
Vulpin 30	Vulpin -10	Vulpin -1	Vulpin -5	Vulpin 0
Agrostis 43	Agrostis -10	Agrostis -8	Agrostis -3	Agrostis 0
Gaillet 14	Gaillet -10	Gaillet -3	Gaillet -5	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 33
Mercuriale -1	Mercuriale 0	Mercuriale 0		Mercuriale 0
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 13
Agrostis -1	Agrostis 0	Agrostis 0		Agrostis 21
Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 0

Année 4 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Moyen	Jul-d3 50% Aoû-d3 50%	Pas de labour	12 gr/m ²
Chénopode	-31	Chénopode -3	Chénopode 0	Chénopode 0
Mercuriale	10	Mercuriale -1	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Vulpin	89	Vulpin -3	Vulpin 0	Vulpin 0
Agrostis	8	Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0
Gaillet	25	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
40 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Chénopode	0	Chénopode 0		Chénopode 21
Mercuriale	0	Mercuriale 0		Mercuriale 3
Vulpin	0	Vulpin 0		Vulpin 80
Agrostis	0	Agrostis 0		Agrostis 2
Gaillet	0	Gaillet 0		Gaillet 19

Année 5 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Très faible	Mar-d3 50% Mar-d1 50% Mar-d2 50% Aoû-d1 50%	Déc-d1	12 gr/m ²
Chénopode	66	Chénopode -10	Chénopode -1	Chénopode 0
Mercuriale	50	Mercuriale -1	Mercuriale -2	Mercuriale 0
Vulpin	35	Vulpin -5	Vulpin -4	Vulpin 0
Agrostis	9	Agrostis -5	Agrostis -3	Agrostis 0
Gaillet	4	Gaillet -1	Gaillet -7	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Chénopode	0	Chénopode 0		Chénopode 55
Mercuriale	0	Mercuriale 0		Mercuriale 47
Vulpin	0	Vulpin 0		Vulpin 26
Agrostis	0	Agrostis 0		Agrostis 2
Gaillet	0	Gaillet 0		Gaillet 0

Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Oct-d2 50%	Pas de labour	180 gr/m ²
Chénopode 8	Chénopode -4	Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0
Mercuriale 18	Mercuriale -4	Mercuriale -2	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -5	Vulpin 0	Vulpin 0
Agrostis 40	Agrostis -4	Agrostis -1	Agrostis 0	Agrostis 0
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet -5	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Chénopode -1	Chénopode -1	Chénopode 0		Chénopode 2
Mercuriale -1	Mercuriale -1	Mercuriale 0		Mercuriale 10
Vulpin -1	Vulpin -1	Vulpin 0		Vulpin 24
Agrostis -1	Agrostis -1	Agrostis 0		Agrostis 33
Gaillet -1	Gaillet -1	Gaillet 0		Gaillet 83