

Exploitation :

Bio

Commentaires :

Parcelle :

Bio

Type de sol :

Groie

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	8
Ray-grass	10
Gaillet	27
Folleavoine	23
Chénopode	49

Situation initiale :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Faible	Oct-d2 50%	Non définie	350 gr/m ²
Vulpin 14	Vulpin -4	Vulpin -5	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 18	Ray-grass -4	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 84	Gaillet -4	Gaillet -5	Gaillet 0	Gaillet 0
Folleavoine 15	Folleavoine -4	Folleavoine -1	Folleavoine 0	Folleavoine 0
Chénopode 6	Chénopode -4	Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
25 cm	Non couvrante	Bineuse : Fév-d2		Vulpin 5
Vulpin 0	Vulpin 0	Houe rotative : Herse étrille : Déc-d2		Ray-grass 10
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Vulpin -1		Gaillet 71
Gaillet 0	Gaillet 0	Ray-grass -0		Folleavoine 7
Folleavoine 0	Folleavoine 0	Gaillet -4		Chénopode 1
Chénopode 0	Chénopode 0	Folleavoine -3		
		Chénopode -1		

Année 2 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Fév-d1 50% Aoû-d3 50% Avr-d1 50%	Non définie	12 gr/m ²
Vulpin 21	Vulpin 0	Vulpin -5	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 19	Ray-grass 0	Ray-grass -6	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 2	Gaillet 0	Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0
Folle-avoine 56	Folle-avoine 0	Folle-avoine -6	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Chénopode 63	Chénopode 0	Chénopode -5	Chénopode 0	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Mai-d2 Jun-d1 Houe rotative : Herse étrille : Avr-d2		Vulpin 14 Ray-grass 11 Gaillet 0 Folle-avoine 43 Chénopode 49
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -2		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -2		
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -0		
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine -6		
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -8		

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Faible	Oct-d2 50%	Non définie	350 gr/m ²
Vulpin 14	Vulpin -4	Vulpin -5	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 18	Ray-grass -4	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 84	Gaillet -4	Gaillet -5	Gaillet 0	Gaillet 0
Folle-avoine 15	Folle-avoine -4	Folle-avoine -1	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Chénopode 6	Chénopode -4	Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
25 cm	Non couvrante	Bineuse : Fév-d2 Houe rotative : Herse étrille : Déc-d2		Vulpin 5 Ray-grass 10 Gaillet 71 Folle-avoine 7 Chénopode 1
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -1		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -0		
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -4		
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine -3		
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -1		

Année 4 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Aoû-d3 50% Fév-d1 50% Avr-d1 50%	Non définie	12 gr/m ²
Vulpin 21	Vulpin 0	Vulpin -5	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 19	Ray-grass 0	Ray-grass -6	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 2	Gaillet 0	Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0
Folle-avoine 56	Folle-avoine 0	Folle-avoine -6	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Chénopode 68	Chénopode 0	Chénopode -5	Chénopode 0	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Mai-d2 Jul-d1 Houe rotative : Herse étrille : Avr-d3		
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin -2	Vulpin 12	
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass 10	
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet -0	Gaillet 0	
Folle-avoine -2	Folle-avoine 0	Folle-avoine -5	Folle-avoine 43	
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode -6	Chénopode 55	