

Exploitation : loyau
Parcelle : la morinière
Type de sol : argilo calcaire

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Ray-grass	14	
Gaillet	28	
Mercuriale	58	
Renouée liseron	49	

Situation initiale :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Jul-d3 50% Aoû-d2 50% Sep-d1 50%	Pas de labour	300 gr/m²
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -9	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Mercuriale 18	Mercuriale -4	Mercuriale -1	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d2	
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 20
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 87
Mercuriale -2	Mercuriale 0	Mercuriale 0		Mercuriale 11
Renouée liseron -2	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0

Année 2 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Mar-d3 50%	Déc-d2	12 gr/m²
Ray-grass 19	Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Gaillet 2	Gaillet 0	Gaillet -0	Gaillet -13	Gaillet 0
Mercuriale 101	Mercuriale 0	Mercuriale -1	Mercuriale -4	Mercuriale 0
Renouée liseron 134	Renouée liseron 0	Renouée liseron -2	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Mai-d2	Mai-d3 Avr-d2 Mai-d1	Ray-grass 9
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass -0		Gaillet 0
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Mercuriale 88
Mercuriale -2	Mercuriale 0	Mercuriale -6		Renouée liseron 117
Renouée liseron -2	Renouée liseron 0	Renouée liseron -7		

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Aoû-d2 50% Sep-d1 50% Jul-d3 50%	Pas de labour	300 gr/m²
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -9	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Mercuriale 18	Mercuriale -4	Mercuriale -1	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d2	Ray-grass 20
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Gaillet 87
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Mercuriale 11
Mercuriale -2	Mercuriale 0	Mercuriale 0		Renouée liseron 0
Renouée liseron -2	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		

Année 4 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Mar-d3 50%	Déc-d2	12 gr/m²
Ray-grass 19	Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Gaillet 2	Gaillet 0	Gaillet -0	Gaillet -13	Gaillet 0
Mercuriale 101	Mercuriale 0	Mercuriale -1	Mercuriale -4	Mercuriale 0
Renouée liseron 134	Renouée liseron 0	Renouée liseron -2	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Mai-d2	Mai-d3 Avr-d2 Mai-d1	Ray-grass 9
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass -0		Gaillet 0
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Mercuriale 88
Mercuriale -2	Mercuriale 0	Mercuriale -6		Renouée liseron 117
Renouée liseron -2	Renouée liseron 0	Renouée liseron -7		

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Jul-d3 50% Aoû-d2 50% Sep-d1 50%	Pas de labour	300 gr/m²
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -9	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Mercuriale 18	Mercuriale -4	Mercuriale -1	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d2	Ray-grass 20
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Gaillet 87
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Mercuriale 11
Mercuriale -2	Mercuriale 0	Mercuriale 0		Renouée liseron 0
Renouée liseron -2	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		

Année 6 - Tournesol

Date de semis

Avr-d2

Ray-grass	19
Gaillet	2
Mercuriale	92
Renouée liseron	127

Étouffement culture

Association de cultures :
Très faible

Ray-grass	0
Gaillet	0
Mercuriale	0
Renouée liseron	0

Interculture

Mar-d3 50%

Ray-grass	-2
Gaillet	-0
Mercuriale	-1
Renouée liseron	-2

Date de labour

Déc-d2

Ray-grass	-6
Gaillet	-13
Mercuriale	-4
Renouée liseron	-6

Densité de semis

12 gr/m²

Ray-grass	0
Gaillet	0
Mercuriale	0
Renouée liseron	0

Entre rangs

42 cm

Ray-grass	0
Gaillet	0
Mercuriale	0
Renouée liseron	0

Variété

Non couvrante

Ray-grass	0
Gaillet	0
Mercuriale	0
Renouée liseron	0

Désherbage mécanique

Bineuse :

Mai-d2

Houe rotative :
Herse étrille :

Ray-grass	-0
Gaillet	0
Mercuriale	-6
Renouée liseron	-7

Désherbage chimique

Avr-d2

Mai-d1

Score annuel

Ray-grass	11
Gaillet	0
Mercuriale	81
Renouée liseron	111