

Scénario : Semis maïs plus tardif
Exploitation : Non renseigné
Parcelle : Drome Montmeyran irri
Type de sol : Limon sableux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ambroisie à feuilles d'armoise	71 (64)
Datura stramoine	43 (61)
Chénopode	47 (36)

Scénario :

Année 1 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Mai-d2</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise 91</p> <p>Datura stramoine 82</p> <p>Chénopode 47</p>	<p>Association de cultures : Très faible</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</p> <p>Datura stramoine 0</p> <p>Chénopode 0</p>	<p>Avr-d2 50% Mar-d2 50%</p> <p>Mai-d1 50%</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise -9</p> <p>Datura stramoine -0</p> <p>Chénopode -9</p>	<p>Fév-d1</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise -0</p> <p>Datura stramoine -1</p> <p>Chénopode -1</p>	<p>12 gr/m²</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</p> <p>Datura stramoine 0</p> <p>Chénopode 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>42 cm</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</p> <p>Datura stramoine 0</p> <p>Chénopode 0</p>	<p>Non couvrante</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</p> <p>Datura stramoine 0</p> <p>Chénopode 0</p>	<p>Bineuse : Mai-d3</p> <p>Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise -5</p> <p>Datura stramoine -3</p> <p>Chénopode -2</p>		<p>Ambroisie à feuilles d'armoise 76</p> <p>Datura stramoine 78</p> <p>Chénopode 35</p>

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis Nov-d1 Ambroisie à feuilles d'armoise 2 Datura stramoine 0 Chénopode 6	Étouffement culture Association de cultures : Faible Ambroisie à feuilles d'armoise -4 Datura stramoine -4 Chénopode -4	Interculture Oct-d2 50% Ambroisie à feuilles d'armoise 0 Datura stramoine 0 Chénopode -1	Date de labour Oct-d1 Ambroisie à feuilles d'armoise -0 Datura stramoine -1 Chénopode -1	Densité de semis 400 gr/m ² Ambroisie à feuilles d'armoise -2 Datura stramoine -2 Chénopode -2
Entre rangs 15 cm Ambroisie à feuilles d'armoise -1 Datura stramoine -1 Chénopode -1	Variété Moyennement couvrante Ambroisie à feuilles d'armoise -1 Datura stramoine -1 Chénopode -1	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Fév-d3 Mar-d3 Ambroisie à feuilles d'armoise -2 Datura stramoine 0 Chénopode -4	Désherbage chimique	Score annuel Ambroisie à feuilles d'armoise 0 Datura stramoine 0 Chénopode 0

Année 3 - Maïs

Date de semis Avr-d3 Ambroisie à feuilles d'armoise 100 Datura stramoine 52 Chénopode 62	Étouffement culture Association de cultures : Très faible Ambroisie à feuilles d'armoise 0 Datura stramoine 0 Chénopode 0	Interculture Avr-d2 50% Mar-d2 50% Ambroisie à feuilles d'armoise -5 Datura stramoine 0 Chénopode -6	Date de labour Déc-d1 Ambroisie à feuilles d'armoise -0 Datura stramoine -1 Chénopode -1	Densité de semis 12 gr/m ² Ambroisie à feuilles d'armoise 0 Datura stramoine 0 Chénopode 0
Entre rangs 42 cm Ambroisie à feuilles d'armoise -2 Datura stramoine -2 Chénopode -2	Variété Non couvrante Ambroisie à feuilles d'armoise 0 Datura stramoine 0 Chénopode 0	Désherbage mécanique Bineuse : Mai-d3 Jun-d2 Mai-d1 Houe rotative : Herse étrille : Ambroisie à feuilles d'armoise -13 Datura stramoine -10 Chénopode -7	Désherbage chimique	Score annuel Ambroisie à feuilles d'armoise 80 Datura stramoine 40 Chénopode 46