

Scénario : Soja Blé maïs Trit
 Exploitation : Non renseigné
 Parcelle : Drome Montmeyran irri
 Type de sol : Limon sableux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ambroisie à feuilles d'armoise	61 (64) 
Datura stramoine	31 (61) 
Chénopode	41 (36) 

Scénario :

Année 1 - Autre culture de print.

<p>Date de semis</p> <p>Mai-d2</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise 91</p> <p>Datura stramoine 82</p> <p>Chénopode 47</p>	<p>Étouffement culture</p> <p>Association de cultures : Très faible</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</p> <p>Datura stramoine 0</p> <p>Chénopode 0</p>	<p>Interculture</p> <p>Mai-d1 50% Mar-d2 50% Avr-d2 50%</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise -9</p> <p>Datura stramoine -0</p> <p>Chénopode -9</p>	<p>Date de labour</p> <p>Fév-d1</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise -0</p> <p>Datura stramoine -1</p> <p>Chénopode -1</p>	<p>Densité de semis</p> <p>12 gr/m²</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</p> <p>Datura stramoine 0</p> <p>Chénopode 0</p>
<p>Entre rangs</p> <p>42 cm</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</p> <p>Datura stramoine 0</p> <p>Chénopode 0</p>	<p>Variété</p> <p>Non couvrante</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</p> <p>Datura stramoine 0</p> <p>Chénopode 0</p>	<p>Désherbage mécanique</p> <p>Bineuse : Jun-d1 Jun-d2</p> <p>Houe rotative : Mai-d3</p> <p>Herse étrille :</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise -8</p> <p>Datura stramoine -11</p> <p>Chénopode -4</p>	<p>Désherbage chimique</p>	<p>Score annuel</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise 73</p> <p>Datura stramoine 70</p> <p>Chénopode 33</p>

Année 2 - Blé d'hiver

<p>Date de semis</p> <p>Nov-d1</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise 2</p> <p>Datura stramoine 0</p> <p>Chénopode 6</p>	<p>Étouffement culture</p> <p>Association de cultures : Faible</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise -4</p> <p>Datura stramoine -4</p> <p>Chénopode -4</p>	<p>Interculture</p> <p>Oct-d2 50%</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</p> <p>Datura stramoine 0</p> <p>Chénopode -1</p>	<p>Date de labour</p> <p>Oct-d1</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise -0</p> <p>Datura stramoine -1</p> <p>Chénopode -1</p>	<p>Densité de semis</p> <p>400 gr/m²</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise -2</p> <p>Datura stramoine -2</p> <p>Chénopode -2</p>
<p>Entre rangs</p> <p>15 cm</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise -1</p> <p>Datura stramoine -1</p> <p>Chénopode -1</p>	<p>Variété</p> <p>Moyennement couvrante</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise -1</p> <p>Datura stramoine -1</p> <p>Chénopode -1</p>	<p>Désherbage mécanique</p> <p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Fév-d3 Mar-d3</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise -2</p> <p>Datura stramoine 0</p> <p>Chénopode -4</p>	<p>Désherbage chimique</p>	<p>Score annuel</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</p> <p>Datura stramoine 0</p> <p>Chénopode 0</p>

Année 3 - Maïs

<p>Date de semis</p> <p>Avr-d2</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise 96</p> <p>Datura stramoine 36</p> <p>Chénopode 68</p>	<p>Étouffement culture</p> <p>Association de cultures : Très faible</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</p> <p>Datura stramoine 0</p> <p>Chénopode 0</p>	<p>Interculture</p> <p>Avr-d2 50% Mar-d2 50%</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise -5</p> <p>Datura stramoine 0</p> <p>Chénopode -6</p>	<p>Date de labour</p> <p>Fév-d1</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise -0</p> <p>Datura stramoine -1</p> <p>Chénopode -1</p>	<p>Densité de semis</p> <p>12 gr/m²</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</p> <p>Datura stramoine 0</p> <p>Chénopode 0</p>
<p>Entre rangs</p> <p>42 cm</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise -2</p> <p>Datura stramoine -2</p> <p>Chénopode -2</p>	<p>Variété</p> <p>Non couvrante</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</p> <p>Datura stramoine 0</p> <p>Chénopode 0</p>	<p>Désherbage mécanique</p> <p>Bineuse : Jun-d2 Mai-d3 Mai-d1</p> <p>Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise -13</p> <p>Datura stramoine -10</p> <p>Chénopode -7</p>	<p>Désherbage chimique</p>	<p>Score annuel</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise 76</p> <p>Datura stramoine 24</p> <p>Chénopode 52</p>

Année 4 - Triticale

<p>Date de semis</p> <p>Nov-d3</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</p> <p>Datura stramoine 0</p> <p>Chénopode 0</p>	<p>Étouffement culture</p> <p>Association de cultures : Moyen</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise -6</p> <p>Datura stramoine -6</p> <p>Chénopode -6</p>	<p>Interculture</p> <p>Nov-d2 50%</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</p> <p>Datura stramoine 0</p> <p>Chénopode 0</p>	<p>Date de labour</p> <p>Nov-d2</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise -0</p> <p>Datura stramoine -1</p> <p>Chénopode -1</p>	<p>Densité de semis</p> <p>400 gr/m²</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise -2</p> <p>Datura stramoine -2</p> <p>Chénopode -2</p>
<p>Entre rangs</p> <p>15 cm</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise -1</p> <p>Datura stramoine -1</p> <p>Chénopode -1</p>	<p>Variété</p> <p>Très couvrante</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise -2</p> <p>Datura stramoine -2</p> <p>Chénopode -2</p>	<p>Désherbage mécanique</p> <p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Fév-d2 Mar-d2</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise -1</p> <p>Datura stramoine 0</p> <p>Chénopode -3</p>	<p>Désherbage chimique</p>	<p>Score annuel</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</p> <p>Datura stramoine 0</p> <p>Chénopode 0</p>