

Scénario : POIS
 Exploitation : Loyau
 Parcelle : Courterie
 Type de sol : argilo calcaire

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	17 (25)
Gaillet	30 (31)
Mercuriale	49 (49)
Renouée liseron	40 (38)

Scénario :
Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis Oct-d3 Ray-grass 35 Gaillet 93 Mercuriale 18 Renouée liseron 1	Étouffement culture Association de cultures : Faible Ray-grass -4 Gaillet -4 Mercuriale -4 Renouée liseron -4	Interculture Sep-d2 50% Ray-grass -5 Gaillet -1 Mercuriale -0 Renouée liseron 0	Date de labour Pas de labour Ray-grass 0 Gaillet 0 Mercuriale 0 Renouée liseron 0	Densité de semis 300 gr/m ² Ray-grass 0 Gaillet 0 Mercuriale 0 Renouée liseron 0
Entre rangs cm Ray-grass -2 Gaillet -2 Mercuriale -2 Renouée liseron -2	Variété Moyennement couvrante Ray-grass -1 Gaillet -1 Mercuriale -1 Renouée liseron -1	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Gaillet 0 Mercuriale 0 Renouée liseron 0	Désherbage chimique Mar-d2 Ray-grass 23 Gaillet 85 Mercuriale 10 Renouée liseron 0	Score annuel Ray-grass 23 Gaillet 85 Mercuriale 10 Renouée liseron 0

Année 2 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Sep-d1 50% Mar-d3 50% Jul-d3 50% Aoû-d2 50%	Pas de labour	12 gr/m ²
Ray-grass 19	Ray-grass 0	Ray-grass -11	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 2	Gaillet 0	Gaillet -0	Gaillet 0	Gaillet 0
Mercuriale 101	Mercuriale 0	Mercuriale -1	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Renouée liseron 134	Renouée liseron 0	Renouée liseron -2	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d2	Mai-d2 Avr-d2	Ray-grass 7
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Houe rotative : Herse étrille :		Gaillet 0
Gaillet -2	Gaillet 0	Ray-grass 0		Mercuriale 93
Mercuriale -2	Mercuriale 0	Gaillet 0		Renouée liseron 127
Renouée liseron -2	Renouée liseron 0	Mercuriale -4		
		Renouée liseron -4		

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Ray-grass 0	Pas de labour	300 gr/m ²
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Gaillet 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 93	Gaillet -4	Mercuriale 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Mercuriale 18	Mercuriale -4	Renouée liseron 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4		Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d2	Ray-grass 28
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Gaillet 86
Gaillet -2	Gaillet -1	Gaillet 0		Mercuriale 11
Mercuriale -2	Mercuriale -1	Mercuriale 0		Renouée liseron 0
Renouée liseron -2	Renouée liseron -1	Renouée liseron 0		

Année 4 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Sep-d1 50% Jul-d3 50% Aoû-d2 50% Mar-d3 50%	Pas de labour	12 gr/m ²
Ray-grass 19	Ray-grass 0	Ray-grass -11	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 2	Gaillet 0	Gaillet -0	Gaillet 0	Gaillet 0
Mercuriale 101	Mercuriale 0	Mercuriale -1	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Renouée liseron 134	Renouée liseron 0	Renouée liseron -2	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d2	Avr-d2 Mai-d2	Ray-grass 7
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Gaillet 0
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Mercuriale 93
Mercuriale -2	Mercuriale 0	Mercuriale -4		Renouée liseron 127
Renouée liseron -2	Renouée liseron 0	Renouée liseron -4		

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Ray-grass 0	Pas de labour	300 gr/m ²
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Gaillet 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 93	Gaillet -4	Mercuriale 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Mercuriale 18	Mercuriale -4	Renouée liseron 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4		Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass -1	Mar-d2	Ray-grass 28
Ray-grass -2	Gaillet -1	Gaillet 0		Gaillet 86
Gaillet -2	Mercuriale -1	Mercuriale 0		Mercuriale 11
Mercuriale -2	Renouée liseron -1	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0
Renouée liseron -2				

Année 6 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Fév-d3	Association de cultures : Très faible	Jul-d3 50% Aoû-d2 50% Sep-d1 50% Fév-d3 50%	Pas de labour	12 gr/m ²
Ray-grass 28	Ray-grass 0	Ray-grass -9	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 14	Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0
Mercuriale 7	Mercuriale 0	Mercuriale -1	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Renouée liseron 19	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Fév-d3 Mar-d3	Ray-grass 18 Gaillet 12 Mercuriale 7 Renouée liseron 19
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		
Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0		
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		