

Exploitation : Capron  
Parcelle : Hayettes savaux  
Type de sol : limono argileux

Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Agrostis	17	
Vulpin	9	
Gaillet	20	

### Situation initiale :

#### Année 1 - Betteraves

<b>Date de semis</b> <div>Avr-d2</div> <div>Agrostis 1</div> <div>Vulpin 21</div> <div>Gaillet 2</div>	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Très faible <div>Agrostis 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Gaillet 0</div>	<b>Interculture</b> <div>Août-d1 50%</div> <div>Mar-d2 50%</div> <div>Sep-d1 50%</div> <div>Août-d2 50%</div> <div>Agrostis -2</div> <div>Vulpin -7</div> <div>Gaillet -0</div>	<b>Date de labour</b> <div>Nov-d3</div> <div>Agrostis -2</div> <div>Vulpin -4</div> <div>Gaillet -7</div>	<b>Densité de semis</b> 12 gr/m² <div>Agrostis 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Gaillet 0</div>
<b>Entre rangs</b> 42 cm <div>Agrostis 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Gaillet 0</div>	<b>Variété</b> Non couvrante <div>Agrostis 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Gaillet 0</div>	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : <div>Mai-d3</div> Houe rotative : <div>Mai-d2</div> Herse étrille : <div>Agrostis 0</div> <div>Vulpin -1</div> <div>Gaillet 0</div>	<b>Désherbage chimique</b> 	<b>Score annuel</b> <div>Agrostis 0</div> <div>Vulpin 9</div> <div>Gaillet 0</div>

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Oct-d2 50%	Pas de labour	180 gr/m²
Agrostis 40	Agrostis -4	Agrostis -1	Agrostis 0	Agrostis 0
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -5	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet -5	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Mar-d1 Nov-d1 Herse étrille :		Agrostis 29
Agrostis -1	Agrostis -1	Agrostis -4		Vulpin 22
Vulpin -1	Vulpin -1	Vulpin -3		Gaillet 77
Gaillet -1	Gaillet -1	Gaillet -5		

## Année 3 - Pomme de terre

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Très faible	Sep-d1 50% Aoû-d1 50% Avr-d1 50% Mar-d2 50%	Nov-d3	12 gr/m²
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis -2	Agrostis -2	Agrostis 0
Vulpin 15	Vulpin 0	Vulpin -8	Vulpin -4	Vulpin 0
Gaillet 1	Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet -7	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Agrostis 0
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0		Vulpin 3
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Gaillet 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		

## Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Oct-d2 50%	Pas de labour	180 gr/m²
Agrostis 40	Agrostis -4	Agrostis -1	Agrostis 0	Agrostis 0
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -5	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet -5	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Agrostis 33
Agrostis -1	Agrostis -1	Agrostis 0		Vulpin 24
Vulpin -1	Vulpin -1	Vulpin 0		Gaillet 83
Gaillet -1	Gaillet -1	Gaillet 0		

Année 5 - Pois de printemps

Date de semis

Mai-d1

Agrostis	0
Vulpin	9
Gaillet	0

Étouffement culture

Association de cultures :  
Très faible

Agrostis	0
Vulpin	0
Gaillet	0

Interculture

Août-d2 50%    Sep-d1 50%  
Mar-d2 50%    Avr-d2 50%

Agrostis	-2
Vulpin	-8
Gaillet	-1

Date de labour

Nov-d3

Agrostis	-2
Vulpin	-4
Gaillet	-7

Densité de semis

12 gr/m²

Agrostis	0
Vulpin	0
Gaillet	0

Entre rangs

42 cm

Agrostis	0
Vulpin	0
Gaillet	0

Variété

Non couvrante

Agrostis	0
Vulpin	0
Gaillet	0

Désherbage mécanique

Bineuse :  
Houe rotative :  
Mai-d2    Mai-d3  
Herse étrille :

Agrostis	0
Vulpin	-1
Gaillet	0

Désherbage chimique

Score annuel

Agrostis	0
Vulpin	0
Gaillet	0