

Exploitation :
Parcelle :
Type de sol :

MARCHAIS
Haut hivier baraque
sable

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Véronique de perse	38	
Morelle	14	
Mouron	42	
Chénopode	30	
Pensée des champs	67	

Situation initiale :

Année 1 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Fort	Oct-d1 50% Aoû-d2 50%	Oct-d2	220 gr/m²
Véronique de perse 36	Véronique de perse -10	Véronique de perse -7	Véronique de perse -5	Véronique de perse 0
Morelle 0	Morelle -10	Morelle -8	Morelle -3	Morelle 0
Mouron 0	Mouron -10	Mouron -3	Mouron -2	Mouron 0
Chénopode 5	Chénopode -10	Chénopode -6	Chénopode -3	Chénopode 0
Pensée des champs 55	Pensée des champs -10	Pensée des champs -2	Pensée des champs -4	Pensée des champs 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Mar-d1 Fév-d3 Herse étrille :		Véronique de perse 13
Véronique de perse -1	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0		Morelle 0
Morelle -1	Morelle 0	Morelle 0		Mouron 0
Mouron -1	Mouron 0	Mouron 0		Chénopode 0
Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0		Pensée des champs 38
Pensée des champs -1	Pensée des champs 0	Pensée des champs 0		

Année 2 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<div>Avr-d3</div> <div>Véronique de perse</div> <div>50</div> <div>Morelle</div> <div>52</div> <div>Mouron</div> <div>102</div> <div>Chénopode</div> <div>62</div> <div>Pensée des champs</div> <div>25</div>	<div>Association de cultures :</div> <div>Très faible</div> <div>Véronique de perse</div> <div>0</div> <div>Morelle</div> <div>0</div> <div>Mouron</div> <div>0</div> <div>Chénopode</div> <div>0</div> <div>Pensée des champs</div> <div>0</div>	<div>Mar-d2 50%</div> <div>Sep-d1 50%</div> <div>Août-d1 50%</div> <div>Avr-d1 50%</div> <div>Véronique de perse</div> <div>-6</div> <div>Morelle</div> <div>-5</div> <div>Mouron</div> <div>-6</div> <div>Chénopode</div> <div>-9</div> <div>Pensée des champs</div> <div>-6</div>	<div>Pas de labour</div> <div>Véronique de perse</div> <div>0</div> <div>Morelle</div> <div>0</div> <div>Mouron</div> <div>0</div> <div>Chénopode</div> <div>0</div> <div>Pensée des champs</div> <div>0</div>	<div>12 gr/m²</div> <div>Véronique de perse</div> <div>0</div> <div>Morelle</div> <div>0</div> <div>Mouron</div> <div>0</div> <div>Chénopode</div> <div>0</div> <div>Pensée des champs</div> <div>0</div>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<div>42 cm</div> <div>Véronique de perse</div> <div>-2</div> <div>Morelle</div> <div>-2</div> <div>Mouron</div> <div>-2</div> <div>Chénopode</div> <div>-2</div> <div>Pensée des champs</div> <div>-2</div>	<div>Non couvrante</div> <div>Véronique de perse</div> <div>0</div> <div>Morelle</div> <div>0</div> <div>Mouron</div> <div>0</div> <div>Chénopode</div> <div>0</div> <div>Pensée des champs</div> <div>0</div>	<div>Bineuse :</div> <div>Jun-d2</div> <div>Houe rotative :</div> <div>Mai-d3</div> <div>Herse étrille :</div> <div>Véronique de perse</div> <div>-4</div> <div>Morelle</div> <div>-9</div> <div>Mouron</div> <div>-8</div> <div>Chénopode</div> <div>-4</div> <div>Pensée des champs</div> <div>-1</div>		<div>Véronique de perse</div> <div>39</div> <div>Morelle</div> <div>35</div> <div>Mouron</div> <div>86</div> <div>Chénopode</div> <div>47</div> <div>Pensée des champs</div> <div>16</div>

Année 3 - Triticale

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<div>Oct-d3</div> <div>Véronique de perse</div> <div>30</div> <div>Morelle</div> <div>0</div> <div>Mouron</div> <div>0</div> <div>Chénopode</div> <div>2</div> <div>Pensée des champs</div> <div>56</div>	<div>Association de cultures :</div> <div>Moyen</div> <div>Véronique de perse</div> <div>-6</div> <div>Morelle</div> <div>-6</div> <div>Mouron</div> <div>-6</div> <div>Chénopode</div> <div>-6</div> <div>Pensée des champs</div> <div>-6</div>	<div>Oct-d1 50%</div> <div>Véronique de perse</div> <div>-2</div> <div>Morelle</div> <div>-0</div> <div>Mouron</div> <div>0</div> <div>Chénopode</div> <div>-1</div> <div>Pensée des champs</div> <div>-2</div>	<div>Oct-d3</div> <div>Véronique de perse</div> <div>-4</div> <div>Morelle</div> <div>-3</div> <div>Mouron</div> <div>-2</div> <div>Chénopode</div> <div>-3</div> <div>Pensée des champs</div> <div>-4</div>	<div>200 gr/m²</div> <div>Véronique de perse</div> <div>0</div> <div>Morelle</div> <div>0</div> <div>Mouron</div> <div>0</div> <div>Chénopode</div> <div>0</div> <div>Pensée des champs</div> <div>0</div>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<div>15 cm</div> <div>Véronique de perse</div> <div>-1</div> <div>Morelle</div> <div>-1</div> <div>Mouron</div> <div>-1</div> <div>Chénopode</div> <div>-1</div> <div>Pensée des champs</div> <div>-1</div>	<div>Non couvrante</div> <div>Véronique de perse</div> <div>0</div> <div>Morelle</div> <div>0</div> <div>Mouron</div> <div>0</div> <div>Chénopode</div> <div>0</div> <div>Pensée des champs</div> <div>0</div>	<div>Bineuse :</div> <div>Houe rotative :</div> <div>Herse étrille :</div> <div>Véronique de perse</div> <div>0</div> <div>Morelle</div> <div>0</div> <div>Mouron</div> <div>0</div> <div>Chénopode</div> <div>0</div> <div>Pensée des champs</div> <div>0</div>		<div>Véronique de perse</div> <div>17</div> <div>Morelle</div> <div>0</div> <div>Mouron</div> <div>0</div> <div>Chénopode</div> <div>0</div> <div>Pensée des champs</div> <div>44</div>

Année 4 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Fort	Oct-d1 50% Août-d2 50%	Oct-d2	220 gr/m²
Véronique de perse 36	Véronique de perse -10	Véronique de perse -7	Véronique de perse -5	Véronique de perse 0
Morelle 0	Morelle -10	Morelle -8	Morelle -3	Morelle 0
Mouron 0	Mouron -10	Mouron -3	Mouron -2	Mouron 0
Chénopode 5	Chénopode -10	Chénopode -6	Chénopode -3	Chénopode 0
Pensée des champs 55	Pensée des champs -10	Pensée des champs -2	Pensée des champs -4	Pensée des champs 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Mar-d1 Fév-d3		Véronique de perse 13
Véronique de perse -1	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0		Morelle 0
Morelle -1	Morelle 0	Morelle 0		Mouron 0
Mouron -1	Mouron 0	Mouron 0		Chénopode 0
Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0		Pensée des champs 38
Pensée des champs -1	Pensée des champs 0	Pensée des champs 0		

Année 5 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Fév-d2	Association de cultures : Très faible	Août-d1 50% Sep-d1 50%	Fév-d2	12 gr/m²
Véronique de perse 17	Véronique de perse 0	Véronique de perse -4	Véronique de perse -3	Véronique de perse 0
Morelle 0	Morelle 0	Morelle -8	Morelle -3	Morelle 0
Mouron 13	Mouron 0	Mouron -3	Mouron -2	Mouron 0
Chénopode 37	Chénopode 0	Chénopode -5	Chénopode -3	Chénopode 0
Pensée des champs 52	Pensée des champs 0	Pensée des champs -1	Pensée des champs -4	Pensée des champs 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Mai-d1 Mai-d3		Véronique de perse 6
Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Véronique de perse -4		Morelle 0
Morelle 0	Morelle 0	Morelle -4		Mouron 0
Mouron 0	Mouron 0	Mouron -9		Chénopode 23
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -5		Pensée des champs 46
Pensée des champs 0	Pensée des champs 0	Pensée des champs -2		