

Exploitation : Exemple
 Parcelle : CBO
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

| Adventices : | Risque : |
|--------------|----------|
| Vulpin | 58 |
| Ray-grass | 55 |
| Gaillet | 37 |
| Chénopode | 45 |

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

| | | | | |
|---|---|--|---|---|
| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
| Aoû-d3 | Association de cultures : Moyen | Aoû-d1 50% Aoû-d2 50% | Pas de labour | 12 gr/m ² |
| Vulpin 89 Ray-grass 96 Gaillet 25 Chénopode 31 | Vulpin -6 Ray-grass -6 Gaillet -6 Chénopode -6 | Vulpin -1 Ray-grass -5 Gaillet 0 Chénopode -3 | Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0 Chénopode 0 | Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0 Chénopode 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 15 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | | Vulpin 79 Ray-grass 83 Gaillet 17 Chénopode 19 |
| Vulpin -2 Ray-grass -2 Gaillet -2 Chénopode -2 | Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0 Chénopode 0 | Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0 Chénopode 0 | | |

Année 2 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---------------|----------------------------------|--------------|----------------|-----------------------|
| Oct-d1 | Association de cultures : Faible | Aoû-d1 50% | Pas de labour | 200 gr/m ² |
| Vulpin | 87 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | Vulpin 0 |
| Ray-grass | 69 | Ray-grass -4 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 |
| Gaillet | 95 | Gaillet -4 | Gaillet 0 | Gaillet 0 |
| Chénopode | 15 | Chénopode -4 | Chénopode -2 | Chénopode 0 |

| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
|-------------|---------------|---|---------------------|--------------|
| 15 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | | |
| Vulpin | -1 | Vulpin 0 | | Vulpin 82 |
| Ray-grass | -1 | Ray-grass 0 | | Ray-grass 62 |
| Gaillet | -1 | Gaillet 0 | | Gaillet 90 |
| Chénopode | -1 | Chénopode 0 | | Chénopode 9 |

Année 3 - Orge d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---------------|--------------------------------|--------------|----------------|-----------------------|
| Oct-d1 | Association de cultures : Fort | Aoû-d1 50% | Pas de labour | 200 gr/m ² |
| Vulpin | 83 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | Vulpin 0 |
| Ray-grass | 66 | Ray-grass -2 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 |
| Gaillet | 92 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet 0 |
| Chénopode | 9 | Chénopode -2 | Chénopode 0 | Chénopode 0 |

| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
|-------------|---------------|---|---------------------|--------------|
| 15 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | | |
| Vulpin | -1 | Vulpin 0 | | Vulpin 72 |
| Ray-grass | -1 | Ray-grass 0 | | Ray-grass 53 |
| Gaillet | -1 | Gaillet 0 | | Gaillet 82 |
| Chénopode | -1 | Chénopode 0 | | Chénopode 0 |

Année 4 - Betteraves

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---------------|--|--------------|----------------|------------------|
| Mar-d3 | Association de cultures : Très faible | Aoû-d3 50% | Nov-d3 | Non défini |
| Vulpin 35 | Vulpin 0 | Vulpin -3 | Vulpin -2 | Vulpin 0 |
| Ray-grass 33 | Ray-grass 0 | Ray-grass -4 | Ray-grass -2 | Ray-grass 0 |
| Gaillet 4 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet -4 | Gaillet 0 |
| Chénopode 66 | Chénopode 0 | Chénopode -2 | Chénopode -1 | Chénopode 0 |

| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
|-------------|---------------|---|---------------------|--------------|
| Non défini | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | | |
| Vulpin 0 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | | Vulpin 31 |
| Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | | Ray-grass 27 |
| Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | | Gaillet 0 |
| Chénopode 0 | Chénopode 0 | Chénopode 0 | | Chénopode 64 |