


Exploitation : MONS
 Parcelle : Lycée
 Type de sol : limon profond

Commentaires :

Adventices étudiées :

| Adventices : | Risque : |
|--------------|----------|
| Chénopode | 63 |
| Matricaire | 77 |
| Morelle | 2 |
| Mercuriale | 35 |

Situation initiale :


Année 2 - Pois de printemps

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|-----------------|---------------------------------------|---|-------------------------|---|
| Mar-d2 | Association de cultures : Très faible | Aoû-d2 50% | Déc-d1 | 12 gr/m ² |
| Chénopode 64 | Chénopode 0 | Chénopode -2 | Chénopode -1 | Chénopode 0 |
| Matricaire 48 | Matricaire 0 | Matricaire -1 | Matricaire -1 | Matricaire 0 |
| Morelle 0 | Morelle 0 | Morelle -3 | Morelle -1 | Morelle 0 |
| Mercuriale 30 | Mercuriale 0 | Mercuriale 0 | Mercuriale -1 | Mercuriale 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 42 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | | Chénopode 62 Matricaire 46 Morelle 0 Mercuriale 29 |
| Chénopode 0 | Chénopode 0 | Chénopode 0 | | |
| Matricaire 0 | Matricaire 0 | Matricaire 0 | | |
| Morelle 0 | Morelle 0 | Morelle 0 | | |
| Mercuriale 0 | Mercuriale 0 | Mercuriale 0 | | |

Année 3 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|-----------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|
| Oct-d2 | Association de cultures : Faible | Jul-d3 50% | Oct-d2 | 250 gr/m ² |
| Chénopode 11 | Chénopode -4 | Chénopode -2 | Chénopode -1 | Chénopode 0 |
| Matricaire 29 | Matricaire -4 | Matricaire -1 | Matricaire -1 | Matricaire 0 |
| Morelle 0 | Morelle -4 | Morelle -4 | Morelle -1 | Morelle 0 |
| Mercuriale 26 | Mercuriale -4 | Mercuriale -1 | Mercuriale -1 | Mercuriale 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 15 cm | Moyennement couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | | Chénopode 3 Matricaire 22 Morelle 0 Mercuriale 18 |
| Chénopode -1 | Chénopode -1 | Chénopode 0 | | |
| Matricaire -1 | Matricaire -1 | Matricaire 0 | | |
| Morelle -1 | Morelle -1 | Morelle 0 | | |
| Mercuriale -1 | Mercuriale -1 | Mercuriale 0 | | |

Année 4 - Betteraves

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|-----------------|---------------------------------------|---|---------------------|---|
| Mar-d2 | Association de cultures : Très faible | Aoû-d2 50% | Nov-d2 | 12 gr/m ² |
| Chénopode 64 | Chénopode 0 | Chénopode -2 | Chénopode -1 | Chénopode 0 |
| Matricaire 48 | Matricaire 0 | Matricaire -1 | Matricaire -1 | Matricaire 0 |
| Morelle 0 | Morelle 0 | Morelle -3 | Morelle -1 | Morelle 0 |
| Mercuriale 30 | Mercuriale 0 | Mercuriale 0 | Mercuriale -1 | Mercuriale 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 42 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | | Chénopode 62 Matricaire 46 Morelle 0 Mercuriale 29 |
| Chénopode 0 | Chénopode 0 | Chénopode 0 | | |
| Matricaire 0 | Matricaire 0 | Matricaire 0 | | |
| Morelle 0 | Morelle 0 | Morelle 0 | | |
| Mercuriale 0 | Mercuriale 0 | Mercuriale 0 | | |

Année 5 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|-----------------|----------------------------------|---|---------------------|--|
| Oct-d2 | Association de cultures : Faible | Oct-d1 50% | Oct-d2 | 270 gr/m ² |
| Chénopode 11 | Chénopode -4 | Chénopode -1 | Chénopode -1 | Chénopode 0 |
| Matricaire 29 | Matricaire -4 | Matricaire -1 | Matricaire -1 | Matricaire 0 |
| Morelle 0 | Morelle -4 | Morelle -0 | Morelle -1 | Morelle 0 |
| Mercuriale 26 | Mercuriale -4 | Mercuriale -2 | Mercuriale -1 | Mercuriale 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 15 cm | Moyennement couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | | Chénopode 4 Matricaire 21 Morelle 0 Mercuriale 17 |
| Chénopode -1 | Chénopode -1 | Chénopode 0 | | |
| Matricaire -1 | Matricaire -1 | Matricaire 0 | | |
| Morelle -1 | Morelle -1 | Morelle 0 | | |
| Mercuriale -1 | Mercuriale -1 | Mercuriale 0 | | |

Année 6 - Pois de printemps

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---|--|--|--|---|
| Avr-d1 | Association de cultures : Très faible | Avr-d3 50% Aoû-d3 50% | Déc-d1 | 12 gr/m ² |
| Chénopode 66 Matricaire 45 Morelle 8 Mercuriale 72 | Chénopode 0 Matricaire 0 Morelle 0 Mercuriale 0 | Chénopode -5 Matricaire -3 Morelle -2 Mercuriale -4 | Chénopode -1 Matricaire -1 Morelle -1 Mercuriale -1 | Chénopode 0 Matricaire 0 Morelle 0 Mercuriale 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 42 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | | Chénopode 60 Matricaire 41 Morelle 5 Mercuriale 67 |
| Chénopode 0 Matricaire 0 Morelle 0 Mercuriale 0 | Chénopode 0 Matricaire 0 Morelle 0 Mercuriale 0 | Chénopode 0 Matricaire 0 Morelle 0 Mercuriale 0 | | |