


Exploitation : Bruno Pontier  
Parcelle : La Saussaye  
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	6 

### Situation initiale :

#### Année 1 - Maïs

<b>Date de semis</b> Avr-d2 Ray-grass 19	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Très faible Ray-grass 0	<b>Interculture</b> Sep-d2 50% Aoû-d3 50% Sep-d1 50% Ray-grass -14	<b>Date de labour</b> Nov-d2 Ray-grass -4	<b>Densité de semis</b> 12 gr/m² Ray-grass 0
<b>Entre rangs</b> 42 cm Ray-grass -2	<b>Variété</b> Non couvrante Ray-grass 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Mai-d2 Houe rotative : Mai-d3 Herse étrille : Ray-grass -0	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b> Ray-grass 0

#### Année 2 - Féverole d'hiver

<b>Date de semis</b> Nov-d1 Ray-grass 15	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Très faible Ray-grass 0	<b>Interculture</b> Oct-d1 50% Oct-d3 50% Oct-d2 50% Ray-grass -11	<b>Date de labour</b> Oct-d3 Ray-grass -5	<b>Densité de semis</b> 12 gr/m² Ray-grass 0
<b>Entre rangs</b> 42 cm Ray-grass 0	<b>Variété</b> Non couvrante Ray-grass 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b> Ray-grass 0

### Année 3 - Blé d'hiver

<b>Date de semis</b> Nov-d1 Ray-grass 18	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Faible Ray-grass -4	<b>Interculture</b> Aoû-d3 50%   Sep-d2 50% Sep-d3 50%   Sep-d1 50% Ray-grass -19	<b>Date de labour</b> Oct-d3 Ray-grass -5	<b>Densité de semis</b> 400 gr/m² Ray-grass -2
<b>Entre rangs</b> 25 cm Ray-grass 0	<b>Variété</b> Non couvrante Ray-grass 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Avr-d3 Houe rotative : Herse étrille : Nov-d2   Avr-d2 Ray-grass -2	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b> Ray-grass 0

### Année 4 - Luzerne

<b>Date de semis</b> Aoû-d2 Ray-grass 88	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Très faible Ray-grass 0	<b>Interculture</b> Ray-grass 0	<b>Date de labour</b> Non définie Ray-grass 0	<b>Densité de semis</b> 12 gr/m² Ray-grass 0
<b>Entre rangs</b> 42 cm Ray-grass 0	<b>Variété</b> Non couvrante Ray-grass 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b> Ray-grass 88

### Année 5 - Luzerne

<b>Date de semis</b> Non définie Ray-grass 0	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Très faible Ray-grass 0	<b>Interculture</b> Ray-grass 0	<b>Date de labour</b> Non définie Ray-grass 0	<b>Densité de semis</b> 12 gr/m² Ray-grass 0
<b>Entre rangs</b> 42 cm Ray-grass 0	<b>Variété</b> Non couvrante Ray-grass 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b> Ray-grass 0

### Année 6 - Luzerne

<b>Date de semis</b> Non définie Ray-grass 0	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Très faible Ray-grass 0	<b>Interculture</b> Ray-grass 0	<b>Date de labour</b> Non définie Ray-grass 0	<b>Densité de semis</b> 12 gr/m² Ray-grass 0
<b>Entre rangs</b> 42 cm Ray-grass 0	<b>Variété</b> Non couvrante Ray-grass 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b> Ray-grass 0

### Année 7 - Blé d'hiver

<b>Date de semis</b> Nov-d1 Ray-grass 18	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Faible Ray-grass -4	<b>Interculture</b> Sep-d2 50% Sep-d1 50% Aoû-d3 50% Ray-grass -14	<b>Date de labour</b> Oct-d3 Ray-grass -5	<b>Densité de semis</b> 400 gr/m² Ray-grass -2
<b>Entre rangs</b> 12.5 cm Ray-grass -2	<b>Variété</b> Moyennement couvrante Ray-grass -1	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Avr-d2 Avr-d1 Ray-grass -2	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b> Ray-grass 0

### Année 8 - Orge de printemps

<b>Date de semis</b> Mar-d2 Ray-grass 35	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Fort Ray-grass -10	<b>Interculture</b> Sep-d2 50% Sep-d1 50% Aoû-d3 50% Ray-grass -14	<b>Date de labour</b> Nov-d2 Ray-grass -4	<b>Densité de semis</b> 300 gr/m² Ray-grass 0
<b>Entre rangs</b> 25 cm Ray-grass 0	<b>Variété</b> Non couvrante Ray-grass 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Avr-d1 Houe rotative : Herse étrille : Avr-d2 Ray-grass -4	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b> Ray-grass 4

### Année 9 - Féverole d'hiver

<b>Date de semis</b> Nov-d1 Ray-grass 15	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Très faible Ray-grass 0	<b>Interculture</b> Aoû-d3 50% Sep-d1 50% Sep-d2 50% Ray-grass -14	<b>Date de labour</b> Oct-d3 Ray-grass -5	<b>Densité de semis</b> 12 gr/m² Ray-grass 0
<b>Entre rangs</b> 42 cm Ray-grass 0	<b>Variété</b> Non couvrante Ray-grass 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Nov-d2 Avr-d1 Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass -3	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b> Ray-grass 0