

Exploitation : Caroline Jallerat  
Parcelle : Ludovic Beaufiles  
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

  

### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Ray-grass	28	
Vulpin	23	
Folle-avoine	12	
Renouée liseron	20	
Renouée des oiseaux	55	

### Situation initiale :

#### Année 1 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Fort	Aoû-d3 50% Sep-d3 50%	Oct-d1	200 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 66	Ray-grass -10	Ray-grass -9	Ray-grass -12	Ray-grass 0
Vulpin 83	Vulpin -10	Vulpin -8	Vulpin -17	Vulpin 0
Folle-avoine 21	Folle-avoine -10	Folle-avoine -3	Folle-avoine -9	Folle-avoine 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron -10	Renouée liseron 0	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -10	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -3	Renouée des oiseaux 0

  

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
13 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d3	
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 33
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 46
Folle-avoine -2	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Folle-avoine 0
Renouée liseron -2	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0
Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 0

## Année 2 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Août-d3	Association de cultures : Moyen	Jul-d3 50% Août-d2 50%	Août-d3	12 gr/m²
Ray-grass 96	Ray-grass -6	Ray-grass -4	Ray-grass -11	Ray-grass 0
Vulpin 89	Vulpin -6	Vulpin -1	Vulpin -12	Vulpin 0
Folle-avoine 28	Folle-avoine -6	Folle-avoine -0	Folle-avoine -8	Folle-avoine 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -6	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -3	Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
34 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Sep-d1	Ray-grass 75
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Vulpin 69
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Folle-avoine 14
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Renouée liseron 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée des oiseaux 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		

## Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Sep-d1 50% Sep-d3 50%	Non définie	220 gr/m²
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -9	Vulpin 0	Vulpin 0
Folle-avoine 26	Folle-avoine -4	Folle-avoine -3	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d3	Ray-grass 37
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Vulpin 45
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0		Folle-avoine 18
Folle-avoine 0	Folle-avoine -1	Folle-avoine 0		Renouée liseron 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron -1	Renouée liseron 0		Renouée des oiseaux 4
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux 0		

## Année 4 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Très faible	Déc-d1 50%	Déc-d2	12 gr/m²
Ray-grass 35	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Vulpin 38	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -9	Vulpin 0
Folle-avoine 90	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine -7	Folle-avoine 0
Renouée liseron 58	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0
Renouée des oiseaux 123	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -3	Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d3	Ray-grass 28
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Vulpin 29
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Folle-avoine 83
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Renouée liseron 52
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée des oiseaux 120
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		

## Année 5 - Triticale

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Moyen	Oct-d1 50% Sep-d1 50% Sep-d2 50% Sep-d3 50%	Non définie	100 gr/m²
Ray-grass 48	Ray-grass -6	Ray-grass -19	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 56	Vulpin -6	Vulpin -21	Vulpin 0	Vulpin 0
Folle-avoine 13	Folle-avoine -6	Folle-avoine -6	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -6	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d2	Ray-grass 23
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Vulpin 29
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Folle-avoine 1
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Renouée liseron 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée des oiseaux 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		

## Année 6 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Déc-d1 50%	Fév-d2	12 gr/m²
Ray-grass 19	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -7	Ray-grass 0
Vulpin 21	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -10	Vulpin 0
Folle-avoine 56	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine -11	Folle-avoine 0
Renouée liseron 134	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0
Renouée des oiseaux 112	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -3	Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 11
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Vulpin 10
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Folle-avoine 43
Folle-avoine -2	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Renouée liseron 126
Renouée liseron -2	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée des oiseaux 107
Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		

## Année 7 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Faible		Nov-d1	260 gr/m²
Ray-grass 18	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass -9	Ray-grass 0
Vulpin 14	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin -10	Vulpin 0
Folle-avoine 15	Folle-avoine -4	Folle-avoine 0	Folle-avoine -7	Folle-avoine 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -3	Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 4
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Vulpin 0
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0		Folle-avoine 3
Folle-avoine 0	Folle-avoine -1	Folle-avoine 0		Renouée liseron 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron -1	Renouée liseron 0		Renouée des oiseaux 1
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux 0		

## Année 8 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Sep-d2 50%	Oct-d3	230 gr/m²
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -5	Ray-grass -10	Ray-grass 0
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -5	Vulpin -14	Vulpin 0
Folle-avoine 20	Folle-avoine -4	Folle-avoine -2	Folle-avoine -8	Folle-avoine 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -3	Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 14
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Vulpin 11
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0		Folle-avoine 5
Folle-avoine 0	Folle-avoine -1	Folle-avoine 0		Renouée liseron 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron -1	Renouée liseron 0		Renouée des oiseaux 1
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux 0		

## Année 9 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Moyen		Aoû-d3	12 gr/m²
Ray-grass 96	Ray-grass -6	Ray-grass 0	Ray-grass -11	Ray-grass 0
Vulpin 89	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin -12	Vulpin 0
Folle-avoine 28	Folle-avoine -6	Folle-avoine 0	Folle-avoine -8	Folle-avoine 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -6	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -3	Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
34 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 79
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Vulpin 71
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Folle-avoine 14
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Renouée liseron 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée des oiseaux 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		