





Scénario : test2  
Exploitation : Anitta Servant  
Parcelle : SystemeInitial  
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Amarante réfléchie	35 ( 31) 
Renouée persicaire	59 ( 61) 
Chénopode	50 ( 54) 
Renouée des oiseaux	39 ( 48) 

### Scénario :

#### Année 1 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Très faible	Avr-d2 50% Avr-d1 50%	Fév-d2	12 gr/m²
Amarante réfléchie 52	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie -1	Amarante réfléchie 0
Renouée persicaire 132	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -9	Renouée persicaire -1	Renouée persicaire 0
Chénopode 62	Chénopode 0	Chénopode -7	Chénopode -1	Chénopode 0
Renouée des oiseaux 92	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -13	Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d1 Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d2	Amarante réfléchie 44
Amarante réfléchie -2	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie -5		Renouée persicaire 115
Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -4		Chénopode 51
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode -2		Renouée des oiseaux 75
Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -2		

## Année 2 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d2	Association de cultures : Très faible	Mai-d1 50%    Avr-d1 50%	Fév-d2	12 gr/m²
Amarante réfléchie 82	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie -0	Amarante réfléchie -1	Amarante réfléchie 0
Renouée persicaire 94	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -11	Renouée persicaire -1	Renouée persicaire 0
Chénopode 47	Chénopode 0	Chénopode -6	Chénopode -1	Chénopode 0
Renouée des oiseaux 48	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -12	Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d1    Jun-d2    Jun-d3 Houe rotative : Herse étrille :		Amarante réfléchie 64
Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie -17		Renouée persicaire 73
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -9		Chénopode 35
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -5		Renouée des oiseaux 32
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -3		

## Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Oct-d2 50%    Oct-d3 50%	Oct-d1	170 gr/m²
Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie -4	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie -1	Amarante réfléchie 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -4	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -1	Renouée persicaire 0
Chénopode 8	Chénopode -4	Chénopode -1	Chénopode -1	Chénopode 0
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Amarante réfléchie 0
Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0		Renouée persicaire 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0		Chénopode 3
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Renouée des oiseaux 5
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		