

Exploitation :
Parcelle :
Type de sol :

earl la belle etoile
gilerie
Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Folle-avoine	33
Ray-grass	25
Renouée des oiseaux	56
Morelle	17
Renouée liseron	50

Situation initiale :

Année 1 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Avr-d2</p> <p>Folle-avoine 56</p> <p>Ray-grass 19</p> <p>Renouée des oiseaux 112</p> <p>Morelle 36</p> <p>Renouée liseron 134</p>	<p>Association de cultures : Très faible</p> <p>Folle-avoine 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Morelle 0</p> <p>Renouée liseron 0</p>	<p>Août-d2 50%</p> <p>Folle-avoine -0</p> <p>Ray-grass -3</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Morelle -3</p> <p>Renouée liseron 0</p>	<p>Fév-d2</p> <p>Folle-avoine -3</p> <p>Ray-grass -2</p> <p>Renouée des oiseaux -1</p> <p>Morelle -1</p> <p>Renouée liseron -2</p>	<p>12 gr/m²</p> <p>Folle-avoine 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Morelle 0</p> <p>Renouée liseron 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>42 cm</p> <p>Folle-avoine -2</p> <p>Ray-grass -2</p> <p>Renouée des oiseaux -2</p> <p>Morelle -2</p> <p>Renouée liseron -2</p>	<p>Non couvrante</p> <p>Folle-avoine 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Morelle 0</p> <p>Renouée liseron 0</p>	<p>Bineuse : Mai-d2</p> <p>Houe rotative :</p> <p>Herse étrille :</p> <p>Folle-avoine -2</p> <p>Ray-grass -0</p> <p>Renouée des oiseaux -4</p> <p>Morelle -2</p> <p>Renouée liseron -7</p>	<p>Avr-d2</p>	<p>Folle-avoine 49</p> <p>Ray-grass 12</p> <p>Renouée des oiseaux 105</p> <p>Morelle 29</p> <p>Renouée liseron 124</p>

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis <div>Oct-d2</div> <div>Folle-avoine 26</div> <div>Ray-grass 52</div> <div>Renouée des oiseaux 9</div> <div>Morelle 0</div> <div>Renouée liseron 1</div>	Étouffement culture Association de cultures : Faible <div>Folle-avoine -4</div> <div>Ray-grass -4</div> <div>Renouée des oiseaux -4</div> <div>Morelle -4</div> <div>Renouée liseron -4</div>	Interculture <div>Sep-d2 50%</div> <div>Folle-avoine -2</div> <div>Ray-grass -5</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div> <div>Morelle -1</div> <div>Renouée liseron 0</div>	Date de labour <div>Oct-d2</div> <div>Folle-avoine -2</div> <div>Ray-grass -3</div> <div>Renouée des oiseaux -1</div> <div>Morelle -1</div> <div>Renouée liseron -2</div>	Densité de semis 180 gr/m² <div>Folle-avoine 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div> <div>Morelle 0</div> <div>Renouée liseron 0</div>
Entre rangs 17 cm <div>Folle-avoine 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div> <div>Morelle 0</div> <div>Renouée liseron 0</div>	Variété Moyennement couvrante <div>Folle-avoine -1</div> <div>Ray-grass -1</div> <div>Renouée des oiseaux -1</div> <div>Morelle -1</div> <div>Renouée liseron -1</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Folle-avoine 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div> <div>Morelle 0</div> <div>Renouée liseron 0</div>	Désherbage chimique <div>Oct-d2</div>	Score annuel <div>Folle-avoine 17</div> <div>Ray-grass 39</div> <div>Renouée des oiseaux 4</div> <div>Morelle 0</div> <div>Renouée liseron 0</div>