

Exploitation :
Parcelle :
Type de sol :

essai
essai1
Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Ray-grass	36	
Gaillet	23	
Chénopode	56	

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis Aoû-d1 Ray-grass 73 Gaillet 5 Chénopode 35	Étouffement culture Association de cultures : Moyen Ray-grass -6 Gaillet -6 Chénopode -6	Interculture Aoû-d1 50% Ray-grass -2 Gaillet 0 Chénopode -2	Date de labour Non définie Ray-grass 0 Gaillet 0 Chénopode 0	Densité de semis 12 gr/m² Ray-grass 0 Gaillet 0 Chénopode 0
Entre rangs 17 cm Ray-grass -2 Gaillet -2 Chénopode -2	Variété Non couvrante Ray-grass 0 Gaillet 0 Chénopode 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Gaillet 0 Chénopode 0	Désherbage chimique	Score annuel Ray-grass 63 Gaillet 0 Chénopode 25

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis Oct-d2 Ray-grass 52 Gaillet 97 Chénopode 11	Étouffement culture Association de cultures : Faible Ray-grass -4 Gaillet -4 Chénopode -4	Interculture Oct-d1 50% Sep-d2 50% Aoû-d2 50% Ray-grass -13 Gaillet -5 Chénopode -4	Date de labour Non définie Ray-grass 0 Gaillet 0 Chénopode 0	Densité de semis 200 gr/m² Ray-grass 0 Gaillet 0 Chénopode 0
Entre rangs 17 cm Ray-grass 0 Gaillet 0 Chénopode 0	Variété Non couvrante Ray-grass 0 Gaillet 0 Chénopode 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Gaillet 0 Chénopode 0	Désherbage chimique	Score annuel Ray-grass 35 Gaillet 88 Chénopode 3

Année 3 - Orge de printemps

Date de semis Mar-d2 Ray-grass 35 Gaillet 5 Chénopode 64	Étouffement culture Association de cultures : Fort Ray-grass -10 Gaillet -10 Chénopode -10	Interculture Ray-grass 0 Gaillet 0 Chénopode 0	Date de labour Déc-d2 Ray-grass -3 Gaillet -6 Chénopode -1	Densité de semis 300 gr/m² Ray-grass 0 Gaillet 0 Chénopode 0
Entre rangs 17 cm Ray-grass 0 Gaillet 0 Chénopode 0	Variété Non couvrante Ray-grass 0 Gaillet 0 Chénopode 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Gaillet 0 Chénopode 0	Désherbage chimique	Score annuel Ray-grass 22 Gaillet 0 Chénopode 53

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis Oct-d2 Ray-grass 52 Gaillet 97 Chénopode 11	Étouffement culture Association de cultures : Faible Ray-grass -4 Gaillet -4 Chénopode -4	Interculture Aoû-d2 50% Oct-d1 50% Sep-d2 50% Ray-grass -13 Gaillet -5 Chénopode -4	Date de labour Non définie Ray-grass 0 Gaillet 0 Chénopode 0	Densité de semis 200 gr/m² Ray-grass 0 Gaillet 0 Chénopode 0
Entre rangs 17 cm Ray-grass 0 Gaillet 0 Chénopode 0	Variété Non couvrante Ray-grass 0 Gaillet 0 Chénopode 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Gaillet 0 Chénopode 0	Désherbage chimique	Score annuel Ray-grass 35 Gaillet 88 Chénopode 3

Année 5 - Pois de printemps

Date de semis Mar-d2 Ray-grass 35 Gaillet 5 Chénopode 64	Étouffement culture Association de cultures : Très faible Ray-grass 0 Gaillet 0 Chénopode 0	Interculture Ray-grass 0 Gaillet 0 Chénopode 0	Date de labour Déc-d2 Ray-grass -3 Gaillet -6 Chénopode -1	Densité de semis 12 gr/m² Ray-grass 0 Gaillet 0 Chénopode 0
Entre rangs 42 cm Ray-grass 0 Gaillet 0 Chénopode 0	Variété Non couvrante Ray-grass 0 Gaillet 0 Chénopode 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Gaillet 0 Chénopode 0	Désherbage chimique	Score annuel Ray-grass 32 Gaillet 0 Chénopode 63