






Exploitation :  
Parcelle :  
Type de sol :

Beucher  
Beucher 01  
Non renseigné

Commentaires :


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Chénopode	48 
Renouée des oiseaux	62 
Ray-grass	5 
Vulpin	7 
Gaillet	0 

### Situation initiale :

#### Année 1 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Mar-d2</p> <p>Chénopode 64</p> <p>Renouée des oiseaux 123</p> <p>Ray-grass 35</p> <p>Vulpin 38</p> <p>Gaillet 5</p>	<p>Association de cultures : Très faible</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Gaillet 0</p>	<p>Mar-d2 50% Jul-d3 50%</p> <p>Août-d2 50% Sep-d1 50%</p> <p>Mar-d1 50%</p> <p>Chénopode -10</p> <p>Renouée des oiseaux -8</p> <p>Ray-grass -11</p> <p>Vulpin -8</p> <p>Gaillet -1</p>	<p>Nov-d2</p> <p>Chénopode -2</p> <p>Renouée des oiseaux -3</p> <p>Ray-grass -7</p> <p>Vulpin -10</p> <p>Gaillet -15</p>	<p>12 gr/m²</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Gaillet 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>42 cm</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Gaillet 0</p>	<p>Non couvrante</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Gaillet 0</p>	<p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Gaillet 0</p>		<p>Chénopode 52</p> <p>Renouée des oiseaux 112</p> <p>Ray-grass 16</p> <p>Vulpin 20</p> <p>Gaillet 0</p>

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Faible		Nov-d1	200 gr/m²
Chénopode 0	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -3	Renouée des oiseaux 0
Ray-grass 0	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass -9	Ray-grass 0
Vulpin 0	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin -10	Vulpin 0
Gaillet 0	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet -16	Gaillet 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 0
Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 0
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 0
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 0
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 0

## Année 3 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Fév-d3	Association de cultures : Fort	Jul-d3 50% Aoû-d1 50% Aoû-d2 50% Aoû-d3 50%	Nov-d3	200 gr/m²
Chénopode 49	Chénopode -10	Chénopode -7	Chénopode -2	Chénopode 0
Renouée des oiseaux 81	Renouée des oiseaux -10	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -3	Renouée des oiseaux 0
Ray-grass 28	Ray-grass -10	Ray-grass -10	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Vulpin 30	Vulpin -10	Vulpin -4	Vulpin -9	Vulpin 0
Gaillet 14	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet -15	Gaillet 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 29
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 67
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 2
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 7
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 0