

Exploitation :

Régis

Parcelle :

Drainé irrigué

Type de sol :

Sableux limoneux

**Commentaires :**

### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Brome mou	28
Paturin	62
Ray-grass	26
Chénopode	51
Lamier pourpre	44

### Situation initiale :

#### Année 1 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d2	Association de cultures : Très faible	Avr-d3 50%   Sep-d1 50%	Pas de labour	12 gr/m <sup>2</sup>
Brome mou 0	Brome mou 0	Brome mou -5	Brome mou 0	Brome mou 0
Paturin 44	Paturin 0	Paturin -4	Paturin 0	Paturin 0
Ray-grass 2	Ray-grass 0	Ray-grass -6	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Chénopode 47	Chénopode 0	Chénopode -5	Chénopode 0	Chénopode 0
Lamier pourpre 47	Lamier pourpre 0	Lamier pourpre -5	Lamier pourpre 0	Lamier pourpre 0
Entre rangs				
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d2	Score annuel
Brome mou 0	Brome mou 0	Brome mou 0	Brome mou 0	Brome mou 0
Paturin 0	Paturin 0	Paturin 0	Paturin 40	Paturin 40
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 42	Chénopode 42
Lamier pourpre 0	Lamier pourpre 0	Lamier pourpre 0	Lamier pourpre 43	Lamier pourpre 43

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Brome mou 0 Paturin 0 Ray-grass 0 Chénopode 0 Lamier pourpre 0	Pas de labour Brome mou 0 Paturin 0 Ray-grass 0 Chénopode 0 Lamier pourpre 0	250 gr/m <sup>2</sup> Brome mou 0 Paturin 0 Ray-grass 0 Chénopode 0 Lamier pourpre 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
14 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d2 Avr-d1	Brome mou 65 Paturin 16 Ray-grass 47 Chénopode 6 Lamier pourpre 21
Brome mou -1 Paturin -1 Ray-grass -1 Chénopode -1 Lamier pourpre -1	Brome mou 0 Paturin 0 Ray-grass 0 Chénopode 0 Lamier pourpre 0	Brome mou 0 Paturin 0 Ray-grass 0 Chénopode 0 Lamier pourpre 0		

## Année 3 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Moyen	Jul-d3 50%	Pas de labour Brome mou 0 Paturin 0 Ray-grass 0 Chénopode 0 Lamier pourpre 0	12 gr/m <sup>2</sup> Brome mou 0 Paturin 0 Ray-grass 0 Chénopode 0 Lamier pourpre 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
14 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Aoû-d3 Fév-d1	Brome mou 97 Paturin 23 Ray-grass 88 Chénopode 21 Lamier pourpre 25
Brome mou -2 Paturin -2 Ray-grass -2 Chénopode -2 Lamier pourpre -2	Brome mou 0 Paturin 0 Ray-grass 0 Chénopode 0 Lamier pourpre 0	Brome mou 0 Paturin 0 Ray-grass 0 Chénopode 0 Lamier pourpre 0		

## Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Faible	Jul-d1 50%	Pas de labour	250 gr/m <sup>2</sup>
Brome mou	93	Brome mou	0	Brome mou
Paturin	25	Paturin	-2	Paturin
Ray-grass	69	Ray-grass	0	Ray-grass
Chénopode	15	Chénopode	-2	Chénopode
Lamier pourpre	33	Lamier pourpre	-1	Lamier pourpre
	-4		0	0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
14 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d1 Avr-d1	
Brome mou	-1	Brome mou	0	Brome mou
Paturin	-1	Paturin	0	Paturin
Ray-grass	-1	Ray-grass	0	Ray-grass
Chénopode	-1	Chénopode	0	Chénopode
Lamier pourpre	-1	Lamier pourpre	0	Lamier pourpre
	0			28

## Année 5 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d1	Association de cultures : Très faible	Sep-d1 50% Avr-d3 50%	Pas de labour	12 gr/m <sup>2</sup>
Brome mou	5	Brome mou	-5	Brome mou
Paturin	49	Paturin	-4	Paturin
Ray-grass	6	Ray-grass	-6	Ray-grass
Chénopode	57	Chénopode	-5	Chénopode
Lamier pourpre	58	Lamier pourpre	-5	Lamier pourpre
	0		0	0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d1	
Brome mou	-2	Brome mou	0	Brome mou
Paturin	-2	Paturin	0	Paturin
Ray-grass	-2	Ray-grass	0	Ray-grass
Chénopode	-2	Chénopode	0	Chénopode
Lamier pourpre	-2	Lamier pourpre	0	Lamier pourpre
	0			51

## Année 6 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d1	Association de cultures : Très faible	Avr-d3 50%	Pas de labour	12 gr/m <sup>2</sup>
Brome mou 5	Brome mou 0	Brome mou -1	Brome mou 0	Brome mou 0
Paturin 49	Paturin 0	Paturin -2	Paturin 0	Paturin 0
Ray-grass 6	Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Chénopode 57	Chénopode 0	Chénopode -3	Chénopode 0	Chénopode 0
Lamier pourpre 58	Lamier pourpre 0	Lamier pourpre -3	Lamier pourpre 0	Lamier pourpre 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d1	Brome mou 2
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0		Paturin 45
Paturin -2	Paturin 0	Paturin 0		Ray-grass 3
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Chénopode 52
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0		Lamier pourpre 53
Lamier pourpre -2	Lamier pourpre 0	Lamier pourpre 0		

## Année 7 - Triticale

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Moyen	Interculture	Pas de labour	250 gr/m <sup>2</sup>
Brome mou 43	Brome mou -6	Brome mou 0	Brome mou 0	Brome mou 0
Paturin 15	Paturin -6	Paturin 0	Paturin 0	Paturin 0
Ray-grass 31	Ray-grass -6	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Chénopode 2	Chénopode -6	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Lamier pourpre 17	Lamier pourpre -6	Lamier pourpre 0	Lamier pourpre 0	Lamier pourpre 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
14 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d1 Oct-d3	Brome mou 36
Brome mou -1	Brome mou 0	Brome mou 0		Paturin 7
Paturin -1	Paturin 0	Paturin 0		Ray-grass 24
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Chénopode 0
Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0		Lamier pourpre 10
Lamier pourpre -1	Lamier pourpre 0	Lamier pourpre 0		