

Exploitation : SALMON Benoit
 Parcelle : 535
 Type de sol : brunisol L à LA(S)

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	56 
Coquelicot	73 

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Moyen	Jul-d3 50%	Aoû-d1	12 gr/m ²
Ray-grass 96	Ray-grass -6	Ray-grass -1	Ray-grass -9	Ray-grass 0
Coquelicot 41	Coquelicot -6	Coquelicot -0	Coquelicot -3	Coquelicot 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 79 Coquelicot 29
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Coquelicot 0	
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Faible	Jul-d3 50%	Sep-d1	12 gr/m ²
Ray-grass 69	Ray-grass -4	Ray-grass -1	Ray-grass -12	Ray-grass 0
Coquelicot 71	Coquelicot -4	Coquelicot -0	Coquelicot -4	Coquelicot 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 50 Coquelicot 60
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Coquelicot 0	
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		

Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Fort	Jul-d3 50%	Aoû-d3	12 gr/m ²
Ray-grass 66	Ray-grass -10	Ray-grass -1	Ray-grass -11	Ray-grass 0
Coquelicot 66	Coquelicot -10	Coquelicot -0	Coquelicot -3	Coquelicot 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 42
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 50