


Exploitation : rémi
 Parcelle : comparaison L/NL
 Type de sol : limon argileux superficiel

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	41
Vulpin	40
Gaillet	27
Brome mou	36


Situation initiale :
Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis Oct-d2	Étouffement culture Association de cultures : Faible	Interculture Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Brome mou 0	Date de labour Oct-d1	Densité de semis 230 gr/m ²
Ray-grass 52 Vulpin 60 Gaillet 97 Brome mou 71	Ray-grass -4 Vulpin -4 Gaillet -4 Brome mou -4		Ray-grass -6 Vulpin -9 Gaillet -7 Brome mou -7	Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Brome mou 0
Entre rangs 12.5 cm	Variété Moyennement couvrante	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Désherbage chimique Nov-d1 Fév-d2	Score annuel
Ray-grass -2 Vulpin -2 Gaillet -2 Brome mou -2	Ray-grass -1 Vulpin -1 Gaillet -1 Brome mou -1	Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Brome mou 0		Ray-grass 39 Vulpin 44 Gaillet 83 Brome mou 57

Année 2 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Moyen	Aoû-d1 50% Aoû-d3 50%	Non définie	12 gr/m ²
Ray-grass 96	Ray-grass -6	Ray-grass -6	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 89	Vulpin -6	Vulpin -3	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 25	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Brome mou 105	Brome mou -6	Brome mou -4	Brome mou 0	Brome mou 0
 Entre rangs	 Variété	 Désherbage mécanique	 Désherbage chimique	 Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Aoû-d3 Nov-d1	Ray-grass 82 Vulpin 78 Gaillet 17 Brome mou 93
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0		

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Faible	Sep-d2 50% Aoû-d1 50%	Non définie	230 gr/m ²
Ray-grass 69	Ray-grass -4	Ray-grass -7	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 87	Vulpin -4	Vulpin -5	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 95	Gaillet -4	Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0
Brome mou 93	Brome mou -4	Brome mou -6	Brome mou 0	Brome mou 0
 Entre rangs	 Variété	 Désherbage mécanique	 Désherbage chimique	 Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d1 Fév-d3	Ray-grass 55 Vulpin 75 Gaillet 86 Brome mou 80
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass 0		
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin 0		
Gaillet -2	Gaillet -1	Gaillet 0		
Brome mou -2	Brome mou -1	Brome mou 0		

Année 4 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d1	Association de cultures : Fort	Fév-d2 50%	Aoû-d3	300 gr/m ²
Ray-grass 33	Ray-grass -10	Ray-grass -0	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Vulpin 36	Vulpin -10	Vulpin -1	Vulpin -6	Vulpin 0
Gaillet 9	Gaillet -10	Gaillet -1	Gaillet -4	Gaillet 0
Brome mou 16	Brome mou -10	Brome mou -1	Brome mou -5	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d2	Ray-grass 15 Vulpin 17 Gaillet 0 Brome mou 0
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0		

Année 5 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d1	Association de cultures : Très faible	Jul-d3 50% Sep-d1 50%	Non définie	12 gr/m ²
Ray-grass 33	Ray-grass 0	Ray-grass -5	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 36	Vulpin 0	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 9	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Brome mou 16	Brome mou 0	Brome mou -4	Brome mou 0	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d2 Mar-d1	Ray-grass 28 Vulpin 32 Gaillet 9 Brome mou 11
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		
Brome mou 0	Brome mou 0	Brome mou 0		