





Scénario : variance labour1
Exploitation : rémi
Parcelle : comparaison L/NL
Type de sol : limon argileux superficiel

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	32 (41) 
Vulpin	28 (40) 
Gaillet	26 (27) 
Brome mou	26 (36) 

Scénario :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis Nov-d1 Ray-grass 18 Vulpin 14 Gaillet 84 Brome mou 21	Étouffement culture Association de cultures : Faible Ray-grass -4 Vulpin -4 Gaillet -4 Brome mou -4	Interculture Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Brome mou 0	Date de labour Oct-d1 Ray-grass -3 Vulpin -4 Gaillet -4 Brome mou -4	Densité de semis 230 gr/m² Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Brome mou 0
Entre rangs 12.5 cm Ray-grass -2 Vulpin -2 Gaillet -2 Brome mou -2	Variété Moyennement couvrante Ray-grass -1 Vulpin -1 Gaillet -1 Brome mou -1	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Brome mou 0	Désherbage chimique Nov-d1 Fév-d2	Score annuel Ray-grass 8 Vulpin 3 Gaillet 73 Brome mou 10

Année 2 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Août-d3	Association de cultures : Moyen	Août-d1 50% Août-d3 50%	Pas de labour	12 gr/m²
Ray-grass 96	Ray-grass -6	Ray-grass -6	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 89	Vulpin -6	Vulpin -3	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 25	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Brome mou 105	Brome mou -6	Brome mou -4	Brome mou 0	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Août-d3 Nov-d1	Ray-grass 82
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Vulpin 78
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Gaillet 17
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Brome mou 93
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0		

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Sep-d2 50% Août-d1 50%	Pas de labour	230 gr/m²
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass -7	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -5	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0
Brome mou 71	Brome mou -4	Brome mou -6	Brome mou 0	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d1 Fév-d3	Ray-grass 38
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Vulpin 48
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin 0		Gaillet 89
Gaillet -2	Gaillet -1	Gaillet 0		Brome mou 58
Brome mou -2	Brome mou -1	Brome mou 0		

Année 4 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d1	Association de cultures : Fort		Pas de labour	300 gr/m²
Ray-grass 33	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 36	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 9	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Brome mou 16	Brome mou -10	Brome mou 0	Brome mou 0	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d2	
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 21
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 24
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 0
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0		Brome mou 4

Année 5 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d1	Association de cultures : Très faible	Jul-d3 50% Sep-d1 50%	Pas de labour	12 gr/m²
Ray-grass 33	Ray-grass 0	Ray-grass -5	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 36	Vulpin 0	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 9	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Brome mou 16	Brome mou 0	Brome mou -4	Brome mou 0	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d2 Mar-d1	
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 28
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 32
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 9
Brome mou 0	Brome mou 0	Brome mou 0		Brome mou 11