

Scénario : 1 - faux-semis ++ décalage
date semis
Exploitation : faux-semis et rotation
Parcelle : parcelle1
Type de sol : LAS

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	26 (37)
Vulpin	23 (37)

Scénario :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis Nov-d1 Ray-grass 18 Vulpin 14	Étouffement culture Association de cultures : Faible Ray-grass -4 Vulpin -4	Interculture Oct-d3 50% Ray-grass -3 Vulpin -4	Date de labour Pas de labour Ray-grass 0 Vulpin 0	Densité de semis 280 gr/m² Ray-grass 0 Vulpin 0
Entre rangs 17.5 cm Ray-grass 0 Vulpin 0	Variété Moyennement couvrante Ray-grass -1 Vulpin -1	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Vulpin 0	Désherbage chimique Mar-d2	Score annuel Ray-grass 10 Vulpin 6

Année 2 - Colza d'hiver

Date de semis Août-d3 Ray-grass 96 Vulpin 89	Étouffement culture Association de cultures : Moyen Ray-grass -6 Vulpin -6	Interculture Août-d2 50% Ray-grass -3 Vulpin -1	Date de labour Pas de labour Ray-grass 0 Vulpin 0	Densité de semis 12 gr/m² Ray-grass 0 Vulpin 0
Entre rangs 17.5 cm Ray-grass -2 Vulpin -2	Variété Non couvrante Ray-grass 0 Vulpin 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Vulpin 0	Désherbage chimique Août-d3 Oct-d3	Score annuel Ray-grass 85 Vulpin 79

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis <div>Oct-d2</div> <div>Ray-grass 52</div> <div>Vulpin 60</div>	Étouffement culture Association de cultures : Faible <div>Ray-grass -4</div> <div>Vulpin -4</div>	Interculture <div>Sep-d1 50%</div> <div>Oct-d1 50%</div> <div>Sep-d3 50%</div> <div>Aoû-d2 50%</div> <div>Ray-grass -17</div> <div>Vulpin -17</div>	Date de labour <div>Pas de labour</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div>	Densité de semis 230 gr/m² <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div>
Entre rangs 17.5 cm <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div>	Variété Moyennement couvrante <div>Ray-grass -1</div> <div>Vulpin -1</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div>	Désherbage chimique <div>Oct-d3</div> <div>Mar-d2</div>	Score annuel <div>Ray-grass 30</div> <div>Vulpin 38</div>

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis <div>Oct-d2</div> <div>Ray-grass 52</div> <div>Vulpin 60</div>	Étouffement culture Association de cultures : Faible <div>Ray-grass -4</div> <div>Vulpin -4</div>	Interculture <div>Aoû-d3 50%</div> <div>Sep-d3 50%</div> <div>Sep-d2 50%</div> <div>Oct-d1 50%</div> <div>Ray-grass -18</div> <div>Vulpin -19</div>	Date de labour <div>Pas de labour</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div>	Densité de semis 230 gr/m² <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div>
Entre rangs 17.5 cm <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div>	Variété Moyennement couvrante <div>Ray-grass -1</div> <div>Vulpin -1</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div>	Désherbage chimique <div>Mar-d2</div> <div>Nov-d2</div>	Score annuel <div>Ray-grass 28</div> <div>Vulpin 35</div>

Année 5 - Maïs

Date de semis <div>Avr-d3</div> <div>Ray-grass 12</div> <div>Vulpin 15</div>	Étouffement culture Association de cultures : Très faible <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div>	Interculture <div>Aoû-d2 50%</div> <div>Mar-d2 50%</div> <div>Avr-d1 50%</div> <div>Sep-d2 50%</div> <div>Mar-d3 50%</div> <div>Ray-grass -14</div> <div>Vulpin -12</div>	Date de labour <div>Nov-d2</div> <div>Ray-grass -2</div> <div>Vulpin -2</div>	Densité de semis 12 gr/m² <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div>
Entre rangs 42 cm <div>Ray-grass -2</div> <div>Vulpin -2</div>	Variété Non couvrante <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div>	Désherbage chimique <div>Mai-d1</div> <div>Jun-d2</div>	Score annuel <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div>