

Exploitation : earl bernard
 Parcelle : guignard
 Type de sol : limon sableux argileux

Commentaires :

Adventices étudiées :

| Adventices : | Risque : |
|---------------------|----------|
| Chénopode | 55 |
| Datura stramoine | 18 |
| Folleavoine | 28 |
| Renouée des oiseaux | 55 |
| Mercuriale | 58 |

Situation initiale :

Année 1 - Maïs



Année 2 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|-----------------------|----------------------------------|---|------------------------|-----------------------|
| Oct-d3 | Association de cultures : Faible | Jul-d3 50% Sep-d1 50% | Oct-d3 | 280 gr/m ² |
| Chénopode 8 | Chénopode -4 | Chénopode -3 | Chénopode -1 | Chénopode 0 |
| Datura stramoine 0 | Datura stramoine -4 | Datura stramoine -6 | Datura stramoine -1 | Datura stramoine 0 |
| Folleavoine 20 | Folleavoine -4 | Folleavoine -1 | Folleavoine -2 | Folleavoine 0 |
| Renouée des oiseaux 9 | Renouée des oiseaux -4 | Renouée des oiseaux 0 | Renouée des oiseaux -1 | Renouée des oiseaux 0 |
| Mercuriale 18 | Mercuriale -4 | Mercuriale -1 | Mercuriale -1 | Mercuriale 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 17.5 cm | Moyennement couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | | |
| Chénopode 0 | Chénopode -1 | Chénopode 0 | | Chénopode 0 |
| Datura stramoine 0 | Datura stramoine -1 | Datura stramoine 0 | | Datura stramoine 0 |
| Folleavoine 0 | Folleavoine -1 | Folleavoine 0 | | Folleavoine 12 |
| Renouée des oiseaux 0 | Renouée des oiseaux -1 | Renouée des oiseaux 0 | | Renouée des oiseaux 4 |
| Mercuriale 0 | Mercuriale -1 | Mercuriale 0 | | Mercuriale 11 |