

Exploitation : gaec denoue  
Parcelle : breuil  
Type de sol : limoneux argileux

Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	15
Paturin	82
Mouron	88
Panic pied-de-coq	41
Renouée des oiseaux	65

### Situation initiale :

#### Année 1 - Maïs

<b>Date de semis</b> Avr-d2 Ray-grass 19 Paturin 48 Mouron 100 Panic pied-de-coq 36 Renouée des oiseaux 112	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Très faible Ray-grass 0 Paturin 0 Mouron 0 Panic pied-de-coq 0 Renouée des oiseaux 0	<b>Interculture</b> Ray-grass 0 Paturin 0 Mouron 0 Panic pied-de-coq 0 Renouée des oiseaux 0	<b>Date de labour</b> Mar-d3 Ray-grass -2 Paturin -1 Mouron -1 Panic pied-de-coq -1 Renouée des oiseaux -2	<b>Densité de semis</b> 12 gr/m² Ray-grass 0 Paturin 0 Mouron 0 Panic pied-de-coq 0 Renouée des oiseaux 0
<b>Entre rangs</b> 42 cm Ray-grass -2 Paturin -2 Mouron -2 Panic pied-de-coq -2 Renouée des oiseaux -2	<b>Variété</b> Non couvrante Ray-grass 0 Paturin 0 Mouron 0 Panic pied-de-coq 0 Renouée des oiseaux 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Paturin 0 Mouron 0 Panic pied-de-coq 0 Renouée des oiseaux 0	<b>Désherbage chimique</b> 	<b>Score annuel</b> Ray-grass 15 Paturin 45 Mouron 97 Panic pied-de-coq 33 Renouée des oiseaux 109

## Année 2 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<div>Avr-d2</div> <div>Ray-grass 19</div> <div>Paturin 48</div> <div>Mouron 100</div> <div>Panic pied-de-coq 36</div> <div>Renouée des oiseaux 112</div>	<div>Association de cultures : Très faible</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Paturin 0</div> <div>Mouron 0</div> <div>Panic pied-de-coq 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div>	<div>Sep-d2 50%</div> <div>Ray-grass -5</div> <div>Paturin -1</div> <div>Mouron -0</div> <div>Panic pied-de-coq -1</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div>	<div>Mar-d3</div> <div>Ray-grass -2</div> <div>Paturin -1</div> <div>Mouron -1</div> <div>Panic pied-de-coq -1</div> <div>Renouée des oiseaux -2</div>	<div>12 gr/m²</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Paturin 0</div> <div>Mouron 0</div> <div>Panic pied-de-coq 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<div>42 cm</div> <div>Ray-grass -2</div> <div>Paturin -2</div> <div>Mouron -2</div> <div>Panic pied-de-coq -2</div> <div>Renouée des oiseaux -2</div>	<div>Non couvrante</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Paturin 0</div> <div>Mouron 0</div> <div>Panic pied-de-coq 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div>	<div>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Paturin 0</div> <div>Mouron 0</div> <div>Panic pied-de-coq 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div>		<div>Ray-grass 10</div> <div>Paturin 43</div> <div>Mouron 97</div> <div>Panic pied-de-coq 32</div> <div>Renouée des oiseaux 109</div>

## Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<div>Oct-d2</div> <div>Ray-grass 52</div> <div>Paturin 22</div> <div>Mouron 2</div> <div>Panic pied-de-coq 0</div> <div>Renouée des oiseaux 9</div>	<div>Association de cultures : Faible</div> <div>Ray-grass -4</div> <div>Paturin -4</div> <div>Mouron -4</div> <div>Panic pied-de-coq -4</div> <div>Renouée des oiseaux -4</div>	<div>Ray-grass 0</div> <div>Paturin 0</div> <div>Mouron 0</div> <div>Panic pied-de-coq 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div>	<div>Oct-d2</div> <div>Ray-grass -3</div> <div>Paturin -1</div> <div>Mouron -1</div> <div>Panic pied-de-coq -1</div> <div>Renouée des oiseaux -1</div>	<div>250 gr/m²</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Paturin 0</div> <div>Mouron 0</div> <div>Panic pied-de-coq 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<div>12.5 cm</div> <div>Ray-grass -2</div> <div>Paturin -2</div> <div>Mouron -2</div> <div>Panic pied-de-coq -2</div> <div>Renouée des oiseaux -2</div>	<div>Non couvrante</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Paturin 0</div> <div>Mouron 0</div> <div>Panic pied-de-coq 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div>	<div>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Paturin 0</div> <div>Mouron 0</div> <div>Panic pied-de-coq 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div>		<div>Ray-grass 43</div> <div>Paturin 15</div> <div>Mouron 0</div> <div>Panic pied-de-coq 0</div> <div>Renouée des oiseaux 3</div>

Année 4 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d3	Association de cultures : Très faible	Aoû-d3 50%	Mai-d3	12 gr/m²
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -4	Ray-grass -2	Ray-grass 0
Paturin 44	Paturin 0	Paturin -2	Paturin -1	Paturin 0
Mouron 76	Mouron 0	Mouron -1	Mouron -1	Mouron 0
Panic pied-de-coq 102	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -2	Panic pied-de-coq -2	Panic pied-de-coq 0
Renouée des oiseaux 31	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 0
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Paturin 41
Paturin 0	Paturin 0	Paturin 0		Mouron 74
Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0		Panic pied-de-coq 98
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0		Renouée des oiseaux 30
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		