

Scénario : scenario 3
Exploitation : gaec fleur de lait
Parcelle : champ de la fosse
Type de sol : limon

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Chénopode	34 (42)	
Folle-avoine	9 (14)	
Mouron	45 (51)	
Véronique de perse	65 (76)	

Scénario :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible		Oct-d3	280 gr/m²
Chénopode 8	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode -3	Chénopode 0
Folle-avoine 20	Folle-avoine -4	Folle-avoine 0	Folle-avoine -8	Folle-avoine 0
Mouron 2	Mouron -4	Mouron 0	Mouron -2	Mouron 0
Véronique de perse 33	Véronique de perse -4	Véronique de perse 0	Véronique de perse -4	Véronique de perse 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0		Chénopode 1
Folle-avoine 0	Folle-avoine -1	Folle-avoine 0		Folle-avoine 7
Mouron 0	Mouron -1	Mouron 0		Mouron 0
Véronique de perse 0	Véronique de perse -1	Véronique de perse 0		Véronique de perse 24

Année 2 - Autre culture d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d1	Association de cultures : Très faible	Aoû-d2 50%	Pas de labour	12 gr/m²
Chénopode 27	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0
Folle-avoine 32	Folle-avoine 0	Folle-avoine -0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Mouron 5	Mouron 0	Mouron -1	Mouron 0	Mouron 0
Véronique de perse 42	Véronique de perse 0	Véronique de perse -1	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Chénopode 25
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Folle-avoine 31
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Mouron 4
Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0		Véronique de perse 40
Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0		

Année 3 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d2	Association de cultures : Très faible		Avr-d3	12 gr/m²
Chénopode 52	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -5	Chénopode 0
Folle-avoine 21	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine -12	Folle-avoine 0
Mouron 91	Mouron 0	Mouron 0	Mouron -4	Mouron 0
Véronique de perse 47	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Véronique de perse -5	Véronique de perse 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Chénopode 45
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0		Folle-avoine 7
Folle-avoine -2	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Mouron 84
Mouron -2	Mouron 0	Mouron 0		Véronique de perse 41
Véronique de perse -2	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0		

Année 4 - Pois d'hiver

Date de semis

Nov-d2

Chénopode	0
Folle-avoine	0
Mouron	0
Véronique de perse	20

Étouffement culture

Association de cultures :
Très faible

Chénopode	0
Folle-avoine	0
Mouron	0
Véronique de perse	0

Interculture

Chénopode	0
Folle-avoine	0
Mouron	0
Véronique de perse	0

Date de labour

Nov-d1

Chénopode	-2
Folle-avoine	-7
Mouron	-2
Véronique de perse	-4

Densité de semis

12 gr/m²

Chénopode	0
Folle-avoine	0
Mouron	0
Véronique de perse	0

Entre rangs

42 cm

Chénopode	0
Folle-avoine	0
Mouron	0
Véronique de perse	0

Variété

Non couvrante

Chénopode	0
Folle-avoine	0
Mouron	0
Véronique de perse	0

Désherbage mécanique

Bineuse :
Houe rotative :
Herse étrille :

Chénopode	0
Folle-avoine	0
Mouron	0
Véronique de perse	0

Désherbage chimique

Score annuel

Chénopode	0
Folle-avoine	0
Mouron	0
Véronique de perse	16