

Scénario : scenario 4
 Exploitation : gaec denoue
 Parcelle : breuil
 Type de sol : limoneux argileux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	17 (15)
Paturin	80 (82)
Mouron	87 (88)
Panic pied-de-coq	39 (41)
Renouée des oiseaux	66 (65)

Scénario :

Année 1 - Mais

<p>Date de semis</p> <p>Avr-d2</p> <p>Ray-grass 19</p> <p>Paturin 48</p> <p>Mouron 100</p> <p>Panic pied-de-coq 36</p> <p>Renouée des oiseaux 112</p>	<p>Étouffement culture</p> <p>Association de cultures : Très faible</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Paturin 0</p> <p>Mouron 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p>	<p>Interculture</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Paturin 0</p> <p>Mouron 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p>	<p>Date de labour</p> <p>Pas de labour</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Paturin 0</p> <p>Mouron 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p>	<p>Densité de semis</p> <p>12 gr/m²</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Paturin 0</p> <p>Mouron 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p>
<p>Entre rangs</p> <p>42 cm</p> <p>Ray-grass -2</p> <p>Paturin -2</p> <p>Mouron -2</p> <p>Panic pied-de-coq -2</p> <p>Renouée des oiseaux -2</p>	<p>Variété</p> <p>Non couvrante</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Paturin 0</p> <p>Mouron 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p>	<p>Désherbage mécanique</p> <p>Bineuse : Jul-d2</p> <p>Houe rotative :</p> <p>Herse étrille :</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Paturin 0</p> <p>Mouron 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p>	<p>Désherbage chimique</p>	<p>Score annuel</p> <p>Ray-grass 17</p> <p>Paturin 46</p> <p>Mouron 98</p> <p>Panic pied-de-coq 34</p> <p>Renouée des oiseaux 110</p>

Année 2 - Maïs

<p>Date de semis</p> <p>Avr-d2</p> <p>Ray-grass 19</p> <p>Paturin 48</p> <p>Mouron 100</p> <p>Panic pied-de-coq 36</p> <p>Renouée des oiseaux 112</p>	<p>Étouffement culture</p> <p>Association de cultures : Très faible</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Paturin 0</p> <p>Mouron 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p>	<p>Interculture</p> <p>Sep-d2 50%</p> <p>Ray-grass -5</p> <p>Paturin -1</p> <p>Mouron -0</p> <p>Panic pied-de-coq -1</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p>	<p>Date de labour</p> <p>Pas de labour</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Paturin 0</p> <p>Mouron 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p>	<p>Densité de semis</p> <p>12 gr/m²</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Paturin 0</p> <p>Mouron 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p>
<p>Entre rangs</p> <p>42 cm</p> <p>Ray-grass -2</p> <p>Paturin -2</p> <p>Mouron -2</p> <p>Panic pied-de-coq -2</p> <p>Renouée des oiseaux -2</p>	<p>Variété</p> <p>Non couvrante</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Paturin 0</p> <p>Mouron 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p>	<p>Désherbage mécanique</p> <p>Bineuse : Jun-d2</p> <p>Houe rotative :</p> <p>Herse étrille :</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Paturin -2</p> <p>Mouron -3</p> <p>Panic pied-de-coq -6</p> <p>Renouée des oiseaux -1</p>	<p>Désherbage chimique</p>	<p>Score annuel</p> <p>Ray-grass 12</p> <p>Paturin 42</p> <p>Mouron 94</p> <p>Panic pied-de-coq 28</p> <p>Renouée des oiseaux 109</p>

Année 3 - Blé d'hiver

<p>Date de semis</p> <p>Oct-d2</p> <p>Ray-grass 52</p> <p>Paturin 22</p> <p>Mouron 2</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p> <p>Renouée des oiseaux 9</p>	<p>Étouffement culture</p> <p>Association de cultures : Faible</p> <p>Ray-grass -4</p> <p>Paturin -4</p> <p>Mouron -4</p> <p>Panic pied-de-coq -4</p> <p>Renouée des oiseaux -4</p>	<p>Interculture</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Paturin 0</p> <p>Mouron 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p>	<p>Date de labour</p> <p>Pas de labour</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Paturin 0</p> <p>Mouron 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p>	<p>Densité de semis</p> <p>250 gr/m²</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Paturin 0</p> <p>Mouron 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p>
<p>Entre rangs</p> <p>12.5 cm</p> <p>Ray-grass -2</p> <p>Paturin -2</p> <p>Mouron -2</p> <p>Panic pied-de-coq -2</p> <p>Renouée des oiseaux -2</p>	<p>Variété</p> <p>Moyennement couvrante</p> <p>Ray-grass -1</p> <p>Paturin -1</p> <p>Mouron -1</p> <p>Panic pied-de-coq -1</p> <p>Renouée des oiseaux -1</p>	<p>Désherbage mécanique</p> <p>Bineuse :</p> <p>Houe rotative :</p> <p>Herse étrille :</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Paturin 0</p> <p>Mouron 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p>	<p>Désherbage chimique</p>	<p>Score annuel</p> <p>Ray-grass 45</p> <p>Paturin 15</p> <p>Mouron 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p> <p>Renouée des oiseaux 2</p>

Année 4 - Autre culture de print.

Date de semis	
Mai-d3	
Ray-grass	0
Paturin	44
Mouron	76
Panic pied-de-coq	102
Renouée des oiseaux	31

Étouffement culture	
Association de cultures : Très faible	
Ray-grass	0
Paturin	0
Mouron	0
Panic pied-de-coq	0
Renouée des oiseaux	0

Interculture	
Aoû-d3 50%	
Ray-grass	-4
Paturin	-2
Mouron	-1
Panic pied-de-coq	-2
Renouée des oiseaux	0

Date de labour	
Mai-d1	
Ray-grass	-2
Paturin	-1
Mouron	-1
Panic pied-de-coq	-1
Renouée des oiseaux	-1

Densité de semis	
12 gr/m ²	
Ray-grass	0
Paturin	0
Mouron	0
Panic pied-de-coq	0
Renouée des oiseaux	0

Entre rangs	
42 cm	
Ray-grass	0
Paturin	0
Mouron	0
Panic pied-de-coq	0
Renouée des oiseaux	0

Variété	
Non couvrante	
Ray-grass	0
Paturin	0
Mouron	0
Panic pied-de-coq	0
Renouée des oiseaux	0

Désherbage mécanique	
Bineuse : Jul-d1	
Houe rotative :	
Herse étrille :	
Ray-grass	0
Paturin	-2
Mouron	-3
Panic pied-de-coq	-6
Renouée des oiseaux	-0

Désherbage chimique	

Score annuel	
Ray-grass	0
Paturin	39
Mouron	72
Panic pied-de-coq	93
Renouée des oiseaux	29