

Exploitation : jmh
 Parcelle : devaltiere
 Type de sol : limo


Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Folle-avoine	18
Ray-grass	32
Digitaire sanguine	15
Ravenelle	70

Situation initiale :

Année 1 - Blé d'hiver



Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Jul-d3 50%	Non définie	250 gr/m ²
Folle-avoine 26	Folle-avoine -4	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Digitaire sanguine 0	Digitaire sanguine -4	Digitaire sanguine -4	Digitaire sanguine 0	Digitaire sanguine 0
Ravenelle 48	Ravenelle -4	Ravenelle -1	Ravenelle 0	Ravenelle 0
 Entre rangs	 Variété	 Désherbage mécanique	 Désherbage chimique	 Score annuel
17.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d2 Fév-d2	Folle-avoine 22 Ray-grass 47 Digitaire sanguine 0 Ravenelle 43
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Digitaire sanguine 0	Digitaire sanguine 0	Digitaire sanguine 0		
Ravenelle 0	Ravenelle 0	Ravenelle 0		

Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Fort	Jul-d3 50%	Non définie	200 gr/m ²
Folle-avoine 13	Folle-avoine -10	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Ray-grass 48	Ray-grass -10	Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Digitaire sanguine 0	Digitaire sanguine -10	Digitaire sanguine -4	Digitaire sanguine 0	Digitaire sanguine 0
Ravenelle 44	Ravenelle -10	Ravenelle -1	Ravenelle 0	Ravenelle 0
 Entre rangs	 Variété	 Désherbage mécanique	 Désherbage chimique	 Score annuel
17.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d2 Fév-d2	Folle-avoine 3 Ray-grass 38 Digitaire sanguine 0 Ravenelle 34
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Digitaire sanguine 0	Digitaire sanguine 0	Digitaire sanguine 0		
Ravenelle 0	Ravenelle 0	Ravenelle 0		

Année 4 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d1	Association de cultures : Très faible	Jul-d3 50% Aoû-d2 50%	Non définie	12 gr/m ²
Folle-avoine 31	Folle-avoine 0	Folle-avoine -0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Ray-grass 6	Ray-grass 0	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Digitaire sanguine 73	Digitaire sanguine 0	Digitaire sanguine -7	Digitaire sanguine 0	Digitaire sanguine 0
Ravenelle 51	Ravenelle 0	Ravenelle -1	Ravenelle 0	Ravenelle 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d1 Jun-d1	Folle-avoine 28 Ray-grass 0 Digitaire sanguine 63 Ravenelle 47
Folle-avoine -2	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Digitaire sanguine -2	Digitaire sanguine 0	Digitaire sanguine 0		
Ravenelle -2	Ravenelle 0	Ravenelle 0		