

Scénario : luzerne
Exploitation : gaec denoue
Parcelle : breuil
Type de sol : limoneux argileux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	17 (15)
Paturin	78 (82)
Mouron	82 (88)
Panic pied-de-coq	34 (41)
Renouée des oiseaux	65 (65)

Scénario :

Année 1 - Luzerne

Date de semis <div>Avr-d2</div> <div>Ray-grass 19</div> <div>Paturin 41</div> <div>Mouron 91</div> <div>Panic pied-de-coq 19</div> <div>Renouée des oiseaux 110</div>	Étouffement culture Association de cultures : Très faible <div>Ray-grass 0</div> <div>Paturin 0</div> <div>Mouron 0</div> <div>Panic pied-de-coq 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div>	Interculture <div>Ray-grass 0</div> <div>Paturin 0</div> <div>Mouron 0</div> <div>Panic pied-de-coq 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div>	Date de labour <div>Mar-d3</div> <div>Ray-grass -2</div> <div>Paturin -1</div> <div>Mouron -1</div> <div>Panic pied-de-coq -1</div> <div>Renouée des oiseaux -2</div>	Densité de semis 12 gr/m² <div>Ray-grass 0</div> <div>Paturin 0</div> <div>Mouron 0</div> <div>Panic pied-de-coq 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div>
Entre rangs 42 cm <div>Ray-grass 0</div> <div>Paturin 0</div> <div>Mouron 0</div> <div>Panic pied-de-coq 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div>	Variété Non couvrante <div>Ray-grass 0</div> <div>Paturin 0</div> <div>Mouron 0</div> <div>Panic pied-de-coq 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Ray-grass 0</div> <div>Paturin 0</div> <div>Mouron 0</div> <div>Panic pied-de-coq 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div>	Désherbage chimique 	Score annuel <div>Ray-grass 17</div> <div>Paturin 40</div> <div>Mouron 90</div> <div>Panic pied-de-coq 18</div> <div>Renouée des oiseaux 109</div>

Année 2 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<div>Avr-d2</div> <div>Ray-grass 19</div> <div>Paturin 41</div> <div>Mouron 91</div> <div>Panic pied-de-coq 19</div> <div>Renouée des oiseaux 110</div>	<div>Association de cultures : Très faible</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Paturin 0</div> <div>Mouron 0</div> <div>Panic pied-de-coq 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div>	<div>Sep-d2 50%</div> <div>Ray-grass -5</div> <div>Paturin -1</div> <div>Mouron -0</div> <div>Panic pied-de-coq -1</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div>	<div>Mar-d3</div> <div>Ray-grass -2</div> <div>Paturin -1</div> <div>Mouron -1</div> <div>Panic pied-de-coq -1</div> <div>Renouée des oiseaux -2</div>	<div>12 gr/m²</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Paturin 0</div> <div>Mouron 0</div> <div>Panic pied-de-coq 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<div>42 cm</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Paturin 0</div> <div>Mouron 0</div> <div>Panic pied-de-coq 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div>	<div>Non couvrante</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Paturin 0</div> <div>Mouron 0</div> <div>Panic pied-de-coq 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div>	<div>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Paturin 0</div> <div>Mouron 0</div> <div>Panic pied-de-coq 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div>		<div>Ray-grass 12</div> <div>Paturin 39</div> <div>Mouron 90</div> <div>Panic pied-de-coq 17</div> <div>Renouée des oiseaux 109</div>

Année 3 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<div>Oct-d2</div> <div>Ray-grass 48</div> <div>Paturin 18</div> <div>Mouron 0</div> <div>Panic pied-de-coq 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div>	<div>Association de cultures : Très faible</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Paturin 0</div> <div>Mouron 0</div> <div>Panic pied-de-coq 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div>	<div>Ray-grass 0</div> <div>Paturin 0</div> <div>Mouron 0</div> <div>Panic pied-de-coq 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div>	<div>Oct-d2</div> <div>Ray-grass -3</div> <div>Paturin -1</div> <div>Mouron -1</div> <div>Panic pied-de-coq -1</div> <div>Renouée des oiseaux -1</div>	<div>250 gr/m²</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Paturin 0</div> <div>Mouron 0</div> <div>Panic pied-de-coq 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<div>12.5 cm</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Paturin 0</div> <div>Mouron 0</div> <div>Panic pied-de-coq 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div>	<div>Non couvrante</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Paturin 0</div> <div>Mouron 0</div> <div>Panic pied-de-coq 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div>	<div>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Paturin 0</div> <div>Mouron 0</div> <div>Panic pied-de-coq 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div>		<div>Ray-grass 46</div> <div>Paturin 17</div> <div>Mouron 0</div> <div>Panic pied-de-coq 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div>

Année 4 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d3	Association de cultures : Très faible	Aoû-d3 50%	Mai-d3	12 gr/m²
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -4	Ray-grass -2	Ray-grass 0
Paturin 44	Paturin 0	Paturin -2	Paturin -1	Paturin 0
Mouron 76	Mouron 0	Mouron -1	Mouron -1	Mouron 0
Panic pied-de-coq 102	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -2	Panic pied-de-coq -2	Panic pied-de-coq 0
Renouée des oiseaux 31	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 0
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Paturin 41
Paturin 0	Paturin 0	Paturin 0		Mouron 74
Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0		Panic pied-de-coq 98
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0		Renouée des oiseaux 30
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		