

Exploitation : Non renseigné  
 Parcelle : les fontaines  
 Type de sol : sableux

**Commentaires :**
  

**Adventices étudiées :**

Adventices :	Risque :
Chénopode	65
Matricaire	65
Mouron	79
Panic pied-de-coq	51

**Situation initiale :**
**Année 1 - Orge d'hiver**

Date de semis  Oct-d3  Chénopode 2 Matricaire 20 Mouron 0 Panic pied-de-coq 0	Étouffement culture  Association de cultures : Fort  Chénopode -10 Matricaire -10 Mouron -10 Panic pied-de-coq -10	Interculture  Oct-d1 50%  Chénopode -1 Matricaire -1 Mouron 0 Panic pied-de-coq -0	Date de labour  Pas de labour  Chénopode 0 Matricaire 0 Mouron 0 Panic pied-de-coq 0	Densité de semis  250 gr/m <sup>2</sup>  Chénopode 0 Matricaire 0 Mouron 0 Panic pied-de-coq 0
Entre rangs  15 cm  Chénopode -1 Matricaire -1 Mouron -1 Panic pied-de-coq -1	Variété  Non couvrante  Chénopode 0 Matricaire 0 Mouron 0 Panic pied-de-coq 0	Désherbage mécanique  Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :  Chénopode 0 Matricaire 0 Mouron 0 Panic pied-de-coq 0	Désherbage chimique  Oct-d3  Chénopode 0	Score annuel  Chénopode 0 Matricaire 8 Mouron 0 Panic pied-de-coq 0

## Année 2 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d2	Association de cultures : Très faible	Avr-d2 50%	Pas de labour	12 gr/m <sup>2</sup>
Chénopode 47	Chénopode 0	Chénopode -3	Chénopode 0	Chénopode 0
Matricaire 33	Matricaire 0	Matricaire -2	Matricaire 0	Matricaire 0
Mouron 86	Mouron 0	Mouron -4	Mouron 0	Mouron 0
Panic pied-de-coq 82	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d2	Chénopode 43
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Matricaire 31
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		Mouron 82
Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0		Panic pied-de-coq 82
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0		

## Année 3 - Haricot

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d3	Association de cultures : Très faible	Mai-d1 50%	Pas de labour	12 gr/m <sup>2</sup>
Chénopode 42	Chénopode 0	Chénopode -3	Chénopode 0	Chénopode 0
Matricaire 30	Matricaire 0	Matricaire -2	Matricaire 0	Matricaire 0
Mouron 76	Mouron 0	Mouron -5	Mouron 0	Mouron 0
Panic pied-de-coq 102	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Jun-d2	Chénopode 39
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Matricaire 28
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		Mouron 71
Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0		Panic pied-de-coq 102
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0		

## Année 4 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1	Association de cultures : Très faible	Avr-d1 50%	Pas de labour	12 gr/m <sup>2</sup>
Chénopode 71	Chénopode 0	Chénopode -3	Chénopode 0	Chénopode 0
Matricaire 49	Matricaire 0	Matricaire -2	Matricaire 0	Matricaire 0
Mouron 93	Mouron 0	Mouron -3	Mouron 0	Mouron 0
Panic pied-de-coq 25	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d1	Chénopode 66 Matricaire 45 Mouron 88 Panic pied-de-coq 23
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0		
Matricaire -2	Matricaire 0	Matricaire 0		
Mouron -2	Mouron 0	Mouron 0		
Panic pied-de-coq -2	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0		