

Scénario : 1  
Exploitation : Non renseigné  
Parcelle : debug  
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Agrostis	23 ( 22)
Amarante réfléchie	4 ( 5)
Ammi élevé	72 ( 68)
Brome stérile	32 ( 39)
Chénopode	38 ( 42)

### Scénario :

#### Année 1 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Très faible	Sep-d1 50%	Nov-d3	12 gr/m²
Agrostis 17	Agrostis 0	Agrostis -0	Agrostis -5	Agrostis 0
Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie -2	Amarante réfléchie -4	Amarante réfléchie 0
Ammi élevé 60	Ammi élevé 0	Ammi élevé -1	Ammi élevé -2	Ammi élevé 0
Brome stérile 16	Brome stérile 0	Brome stérile -5	Brome stérile -11	Brome stérile 0
Chénopode 64	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode -2	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0		Agrostis 12
Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0		Amarante réfléchie 0
Ammi élevé 0	Ammi élevé 0	Ammi élevé 0		Ammi élevé 57
Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile 0		Brome stérile 0
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 60

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Aoû-d2 50% Sep-d2 50%	Non définie	200 gr/m <sup>2</sup>
Agrostis 36	Agrostis -4	Agrostis -0	Agrostis 0	Agrostis 0
Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie -4	Amarante réfléchie -4	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0
Ammi élevé 40	Ammi élevé -4	Ammi élevé -2	Ammi élevé 0	Ammi élevé 0
Brome stérile 71	Brome stérile -4	Brome stérile -8	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Chénopode 11	Chénopode -4	Chénopode -3	Chénopode 0	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Agrostis 30
Agrostis -1	Agrostis 0	Agrostis 0		Amarante réfléchie 0
Amarante réfléchie -1	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0		Ammi élevé 34
Ammi élevé -1	Ammi élevé 0	Ammi élevé 0		Brome stérile 58
Brome stérile -1	Brome stérile 0	Brome stérile 0		Chénopode 3
Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0		

## Année 3 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Moyen	Aoû-d2 50%	Aoû-d3	12 gr/m <sup>2</sup>
Agrostis 8	Agrostis -6	Agrostis 0	Agrostis -4	Agrostis 0
Amarante réfléchie 30	Amarante réfléchie -6	Amarante réfléchie -3	Amarante réfléchie -6	Amarante réfléchie 0
Ammi élevé 18	Ammi élevé -6	Ammi élevé -1	Ammi élevé -2	Ammi élevé 0
Brome stérile 105	Brome stérile -6	Brome stérile -3	Brome stérile -19	Brome stérile 0
Chénopode 31	Chénopode -6	Chénopode -2	Chénopode -4	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Agrostis 0
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0		Amarante réfléchie 15
Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0		Ammi élevé 10
Ammi élevé 0	Ammi élevé 0	Ammi élevé 0		Brome stérile 78
Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile 0		Chénopode 20
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		

## Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Faible	Aoû-d3 50%	Non définie	200 gr/m²
Agrostis 32	Agrostis -4	Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0
Amarante réfléchie 1	Amarante réfléchie -4	Amarante réfléchie -2	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0
Ammi élevé 38	Ammi élevé -4	Ammi élevé -1	Ammi élevé 0	Ammi élevé 0
Brome stérile 93	Brome stérile -4	Brome stérile -4	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Chénopode 15	Chénopode -4	Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Agrostis 27
Agrostis -1	Agrostis 0	Agrostis 0		Amarante réfléchie 0
Amarante réfléchie -1	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0		Ammi élevé 32
Ammi élevé -1	Ammi élevé 0	Ammi élevé 0		Brome stérile 85
Brome stérile -1	Brome stérile 0	Brome stérile 0		Chénopode 9
Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0		

## Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Sep-d1 50%	Oct-d2	12 gr/m²
Agrostis 36	Agrostis -4	Agrostis -0	Agrostis -4	Agrostis 0
Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie -4	Amarante réfléchie -2	Amarante réfléchie -4	Amarante réfléchie 0
Ammi élevé 40	Ammi élevé -4	Ammi élevé -1	Ammi élevé -2	Ammi élevé 0
Brome stérile 71	Brome stérile -4	Brome stérile -5	Brome stérile -22	Brome stérile 0
Chénopode 11	Chénopode -4	Chénopode -2	Chénopode -3	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Agrostis 27
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0		Amarante réfléchie 0
Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0		Ammi élevé 33
Ammi élevé 0	Ammi élevé 0	Ammi élevé 0		Brome stérile 40
Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile 0		Chénopode 2
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		