

Scénario : 2
Exploitation : formation
Parcelle : test
Type de sol : terres rouge

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Folle-avoine	12 (14)
Ray-grass	5 (5)
Gaillet	13 (18)
Véronique de perse	46 (54)
Pensée des champs	45 (56)

Scénario :

Année 1 - Triticale

Date de semis Nov-d2 Folle-avoine 0 Ray-grass 4 Gaillet 72 Véronique de perse 20 Pensée des champs 47	Étouffement culture Association de cultures : Moyen Folle-avoine -6 Ray-grass -6 Gaillet -6 Véronique de perse -6 Pensée des champs -6	Interculture Oct-d2 50% Nov-d1 50% Sep-d1 50% Folle-avoine -3 Ray-grass -11 Gaillet -9 Véronique de perse -5 Pensée des champs -6	Date de labour Pas de labour Folle-avoine 0 Ray-grass 0 Gaillet 0 Véronique de perse 0 Pensée des champs 0	Densité de semis 300 gr/m² Folle-avoine 0 Ray-grass 0 Gaillet 0 Véronique de perse 0 Pensée des champs 0
Entre rangs 12.5 cm Folle-avoine -2 Ray-grass -2 Gaillet -2 Véronique de perse -2 Pensée des champs -2	Variété Non couvrante Folle-avoine 0 Ray-grass 0 Gaillet 0 Véronique de perse 0 Pensée des champs 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Fév-d1 Nov-d2 Folle-avoine -1 Ray-grass -1 Gaillet -6 Véronique de perse -2 Pensée des champs -4	Désherbage chimique	Score annuel Folle-avoine 0 Ray-grass 0 Gaillet 49 Véronique de perse 4 Pensée des champs 29

Année 2 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d2	Association de cultures : Très faible	Jan-d1 50% Août-d1 50%	Jan-d2	12 gr/m²
Folle-avoine 21	Folle-avoine 0	Folle-avoine -1	Folle-avoine -7	Folle-avoine 0
Ray-grass 4	Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -4	Gaillet -11	Gaillet 0
Véronique de perse 47	Véronique de perse 0	Véronique de perse -2	Véronique de perse -3	Véronique de perse 0
Pensée des champs 10	Pensée des champs 0	Pensée des champs -2	Pensée des champs -3	Pensée des champs 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Mai-d1 Mai-d3		Folle-avoine 10
Folle-avoine -2	Folle-avoine 0	Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 0
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Folle-avoine -1		Gaillet 0
Gaillet -2	Gaillet 0	Ray-grass 0		Véronique de perse 38
Véronique de perse -2	Véronique de perse 0	Gaillet 0		Pensée des champs 3
Pensée des champs -2	Pensée des champs 0	Véronique de perse -2		
		Pensée des champs -0		

Année 3 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d3	Association de cultures : Très faible	Avr-d1 50% Avr-d3 50%	Mar-d1	12 gr/m²
Folle-avoine 13	Folle-avoine 0	Folle-avoine -8	Folle-avoine -13	Folle-avoine 0
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -3	Ray-grass -8	Ray-grass 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -0	Gaillet -10	Gaillet 0
Véronique de perse 40	Véronique de perse 0	Véronique de perse -4	Véronique de perse -3	Véronique de perse 0
Pensée des champs 6	Pensée des champs 0	Pensée des champs -5	Pensée des champs -4	Pensée des champs 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mai-d1		Folle-avoine 0
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Ray-grass 0
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Gaillet 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Véronique de perse 33
Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0		Pensée des champs 0
Pensée des champs 0	Pensée des champs 0	Pensée des champs 0		

Année 4 - Triticale

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Moyen	Oct-d2 50% Oct-d1 50%	Pas de labour	300 gr/m²
Folle-avoine 0	Folle-avoine -6	Folle-avoine -3	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Ray-grass 4	Ray-grass -6	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 72	Gaillet -6	Gaillet -13	Gaillet 0	Gaillet 0
Véronique de perse 20	Véronique de perse -6	Véronique de perse -6	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0
Pensée des champs 47	Pensée des champs -6	Pensée des champs -7	Pensée des champs 0	Pensée des champs 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Fév-d2 Nov-d2		Folle-avoine 0
Folle-avoine -2	Folle-avoine 0	Folle-avoine -3		Ray-grass 0
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass -1		Gaillet 46
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet -5		Véronique de perse 4
Véronique de perse -2	Véronique de perse 0	Véronique de perse -2		Pensée des champs 27
Pensée des champs -2	Pensée des champs 0	Pensée des champs -5		

Année 5 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Très faible	Fév-d3 50% Fév-d1 50%	Pas de labour	12 gr/m²
Folle-avoine 90	Folle-avoine 0	Folle-avoine -5	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Ray-grass 35	Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 5	Gaillet 0	Gaillet -3	Gaillet 0	Gaillet 0
Véronique de perse 32	Véronique de perse 0	Véronique de perse -1	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0
Pensée des champs 55	Pensée des champs 0	Pensée des champs -4	Pensée des champs 0	Pensée des champs 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Avr-d2 Mai-d1		Folle-avoine 79
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine -6		Ray-grass 32
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -2		Gaillet 3
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -0		Véronique de perse 27
Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Véronique de perse -4		Pensée des champs 48
Pensée des champs 0	Pensée des champs 0	Pensée des champs -4		