

Exploitation : sylvestre
 Parcelle : oradour
 Type de sol : GM

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Chénopode	57
Chénopode hybride	65
Paturin	53

Situation initiale :

Année 1 - Maïs

Date de semis Avr-d1 Chénopode 71 Chénopode hybride 89 Paturin 46	Étouffement culture Association de cultures : Très faible Chénopode 0 Chénopode hybride 0 Paturin 0	Interculture Fév-d2 50% Mar-d2 50% Chénopode -3 Chénopode hybride -4 Paturin -2	Date de labour Jan-d2 Chénopode -1 Chénopode hybride -1 Paturin -1	Densité de semis 12 gr/m ² Chénopode 0 Chénopode hybride 0 Paturin 0
Entre rangs 42 cm Chénopode -2 Chénopode hybride -2 Paturin -2	Variété Non couvrante Chénopode 0 Chénopode hybride 0 Paturin 0	Désherbage mécanique Bineuse : Jun-d1 Houe rotative : Herse étrille : Avr-d2 Chénopode -5 Chénopode hybride -7 Paturin -4	Désherbage chimique Mai-d2	Score annuel Chénopode 59 Chénopode hybride 75 Paturin 36

Année 2 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1	Association de cultures : Très faible	Mar-d2 50% Fév-d2 50%	Jan-d2	12 gr/m ²
Chénopode 71	Chénopode 0	Chénopode -3	Chénopode -1	Chénopode 0
Chénopode hybride 89	Chénopode hybride 0	Chénopode hybride -4	Chénopode hybride -1	Chénopode hybride 0
Paturin 46	Paturin 0	Paturin -2	Paturin -1	Paturin 0
 Entre rangs	 Variété	 Désherbage mécanique	 Désherbage chimique	 Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d1 Houe rotative : Herse étrille : Avr-d2	Mai-d2	Chénopode 59 Chénopode hybride 75 Paturin 36
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode -5		
Chénopode hybride -2	Chénopode hybride 0	Chénopode hybride -7		
Paturin -2	Paturin 0	Paturin -4		

Année 3 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Fév-d2	Association de cultures : Fort	Fév-d2 50%	Pas de labour	325 gr/m ²
Chénopode 37	Chénopode -10	Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0
Chénopode hybride 46	Chénopode hybride -10	Chénopode -1	Chénopode hybride 0	Chénopode hybride 0
Paturin 27	Paturin -10	Paturin -1	Paturin 0	Paturin 0
 Entre rangs	 Variété	 Désherbage mécanique	 Désherbage chimique	 Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d2 Jan-d2	Chénopode 26 Chénopode hybride 35 Paturin 16
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		
Chénopode hybride 0	Chénopode hybride 0	Chénopode hybride 0		
Paturin 0	Paturin 0	Paturin 0		

Année 4 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Jan-d2	Association de cultures : Très faible	Déc-d2 50% Jul-d2 50%	Jan-d1	12 gr/m ²
Chénopode 8	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode 0
Chénopode hybride 10	Chénopode hybride 0	Chénopode hybride -2	Chénopode hybride -1	Chénopode hybride 0
Paturin 16	Paturin 0	Paturin -2	Paturin -1	Paturin 0
 Entre rangs	 Variété	 Désherbage mécanique	 Désherbage chimique	 Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d3 Avr-d2	Chénopode 5 Chénopode hybride 7 Paturin 12
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		
Chénopode hybride 0	Chénopode hybride 0	Chénopode hybride 0		
Paturin 0	Paturin 0	Paturin 0		

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Jul-d2 50%	Pas de labour	320 gr/m ²
Chénopode 11	Chénopode -4	Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0
Chénopode hybride 8	Chénopode hybride -4	Chénopode hybride -2	Chénopode hybride 0	Chénopode hybride 0
Paturin 22	Paturin -4	Paturin -2	Paturin 0	Paturin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d1 Jan-d2	Chénopode 5
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode hybride 2
Chénopode hybride 0	Chénopode hybride 0	Chénopode hybride 0		Paturin 16
Paturin 0	Paturin 0	Paturin 0		