

Exploitation :
Parcelle :
Type de sol :

Boddaert
exemple1
limoneux

Commentaires :


Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Gaillet	23
Renouée liseron	37
Chénopode	57
Paturin	52


Situation initiale :

Année 1 - Haricot					
Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis	
Jun-d2	Association de cultures : Très faible	Sep-d1 50% Aoû-d3 50% Aoû-d1 50%	Mai-d2	12 gr/m ²	
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -4	Gaillet 0	
Renouée liseron 43	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0	
Chénopode 36	Chénopode 0	Chénopode -5	Chénopode -2	Chénopode 0	
Paturin 44	Paturin 0	Paturin -6	Paturin -2	Paturin 0	
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel	
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Jun-d2 Jul-d1	Gaillet 0	
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Renouée liseron 37	
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Chénopode 29	
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Paturin 36	
Paturin 0	Paturin 0	Paturin 0			


Année 2 - Blé d'hiver




Année 3 - Betteraves




Année 4 - Blé d'hiver




Année 5 - Pomme de terre



Année 6 - Blé d'hiver



Année 7 - Lin de printemps



Année 8 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Sep-d1 50%	Oct-d2	250 gr/m ²
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet -8	Gaillet 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron -3	Renouée liseron 0
Chénopode 11	Chénopode -4	Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode 0
Paturin 22	Paturin -4	Paturin -2	Paturin -2	Paturin 0
Entre rangs				
13 cm	Non couvrante	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 84
Renouée liseron -2	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 2
Paturin -2	Paturin 0	Paturin 0		Paturin 13