

Exploitation : gaec de l'yser
 Parcelle : rubrouck
 Type de sol : limon

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Chénopode	78
Renouée liseron	57
Renouée des oiseaux	86
Morelle	7

Situation initiale :

Année 1 - Pomme de terre

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Aoû-d2 50% Sep-d2 50%	Pas de labour	12 gr/m ²
Chénopode 63	Chénopode 0	Chénopode -3	Chénopode 0	Chénopode 0
Renouée liseron 127	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Renouée des oiseaux 110	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Morelle 19	Morelle 0	Morelle -4	Morelle 0	Morelle 0
Entre rangs				
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Désherbage chimique	Score annuel
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 59
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 127
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 110
Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0		Morelle 15
Variété				

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Oct-d2 50%	Pas de labour	200 gr/m ²
Chénopode 11	Chénopode -4	Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Morelle 0	Morelle -4	Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
13 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Chénopode 5
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0		Renouée liseron 0
Renouée liseron -2	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée des oiseaux 4
Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Morelle 0
Morelle -2	Morelle 0	Morelle 0		

Année 3 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Très faible	Aoû-d2 50% Sep-d2 50%	Déc-d2	12 gr/m ²
Chénopode 66	Chénopode 0	Chénopode -3	Chénopode -1	Chénopode 0
Renouée liseron 85	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -3	Renouée liseron 0
Renouée des oiseaux 128	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0
Morelle 3	Morelle 0	Morelle -4	Morelle -1	Morelle 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d1 Houe rotative : Herse étrille :		Chénopode 60
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -2		Renouée liseron 77
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -5		Renouée des oiseaux 125
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -2		Morelle 0
Morelle 0	Morelle 0	Morelle -5		

Année 4 - Pois de printemps

