

Exploitation : Non renseigné
 Parcelle : maïs
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Chénopode	38
Brome stérile	18
Matricaire	53
Panic pied-de-coq	15



Situation initiale :

Année 1 - Maïs

Date de semis Avr-d3 Chénopode 62 Brome stérile 8 Matricaire 42 Panic pied-de-coq 52	Étouffement culture Association de cultures : Très faible Chénopode 0 Brome stérile 0 Matricaire 0 Panic pied-de-coq 0	Interculture Aoû-d2 50% Chénopode -2 Brome stérile -3 Matricaire -1 Panic pied-de-coq -3	Date de labour Nov-d1 Chénopode -2 Brome stérile -16 Matricaire -2 Panic pied-de-coq -5	Densité de semis 12 gr/m ² Chénopode 0 Brome stérile 0 Matricaire 0 Panic pied-de-coq 0
Entre rangs 42 cm Chénopode -2 Brome stérile -2 Matricaire -2 Panic pied-de-coq -2	Variété Non couvrante Chénopode 0 Brome stérile 0 Matricaire 0 Panic pied-de-coq 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Brome stérile 0 Matricaire 0 Panic pied-de-coq 0	Désherbage chimique	Score annuel Chénopode 56 Brome stérile 0 Matricaire 36 Panic pied-de-coq 42

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Chénopode 0 Brome stérile 0 Matricaire 0 Panic pied-de-coq 0	Oct-d3	350 gr/m ²
Chénopode 8 Brome stérile 45 Matricaire 26 Panic pied-de-coq 0	Chénopode -4 Brome stérile -4 Matricaire -4 Panic pied-de-coq -4	Chénopode 0 Brome stérile 0 Matricaire 0 Panic pied-de-coq 0	Chénopode -3 Brome stérile -20 Matricaire -2 Panic pied-de-coq -5	Chénopode 0 Brome stérile 0 Matricaire 0 Panic pied-de-coq 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Chénopode 2 Brome stérile 21 Matricaire 20 Panic pied-de-coq 0
Chénopode 0 Brome stérile 0 Matricaire 0 Panic pied-de-coq 0	Chénopode 0 Brome stérile 0 Matricaire 0 Panic pied-de-coq 0	Chénopode 0 Brome stérile 0 Matricaire 0 Panic pied-de-coq 0		

Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Fort	Jul-d3 50% Aoû-d2 50%	Pas de labour	200 gr/m ²
Chénopode 9 Brome stérile 92 Matricaire 26 Panic pied-de-coq 1	Chénopode -10 Brome stérile -10 Matricaire -10 Panic pied-de-coq -10	Chénopode -3 Brome stérile -3 Matricaire -3 Panic pied-de-coq -7	Chénopode 0 Brome stérile 0 Matricaire 0 Panic pied-de-coq 0	Chénopode 0 Brome stérile 0 Matricaire 0 Panic pied-de-coq 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Chénopode 0 Brome stérile 78 Matricaire 13 Panic pied-de-coq 0
Chénopode 0 Brome stérile 0 Matricaire 0 Panic pied-de-coq 0	Chénopode 0 Brome stérile 0 Matricaire 0 Panic pied-de-coq 0	Chénopode 0 Brome stérile 0 Matricaire 0 Panic pied-de-coq 0		