

Scénario : maïs modifié
Exploitation : Non renseigné
Parcelle : maïs
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Chénopode	36 (38)	
Brome stérile	16 (18)	
Matricaire	49 (53)	
Panic pied-de-coq	14 (15)	

Scénario :

Année 1 - Maïs

Date de semis <div>Avr-d3</div> <div>Chénopode 62</div> <div>Brome stérile 8</div> <div>Matricaire 42</div> <div>Panic pied-de-coq 52</div>	Étouffement culture Association de cultures : Très faible <div>Chénopode 0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Panic pied-de-coq 0</div>	Interculture <div>Aoû-d2 50%</div> <div>Chénopode -2</div> <div>Brome stérile -3</div> <div>Matricaire -1</div> <div>Panic pied-de-coq -3</div>	Date de labour <div>Nov-d1</div> <div>Chénopode -1</div> <div>Brome stérile -8</div> <div>Matricaire -1</div> <div>Panic pied-de-coq -2</div>	Densité de semis 12 gr/m² <div>Chénopode 0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Panic pied-de-coq 0</div>
Entre rangs 45 cm <div>Chénopode -2</div> <div>Brome stérile -2</div> <div>Matricaire -2</div> <div>Panic pied-de-coq -2</div>	Variété Non couvrante <div>Chénopode 0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Panic pied-de-coq 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : <div>Mai-d3</div> Houe rotative : Herse étrille : <div>Chénopode -2</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Matricaire -2</div> <div>Panic pied-de-coq -3</div>	Désherbage chimique 	Score annuel <div>Chénopode 55</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Matricaire 36</div> <div>Panic pied-de-coq 41</div>

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Aoû-d2 50% Sep-d1 50%	Oct-d3	350 gr/m²
Chénopode 8	Chénopode -4	Chénopode -3	Chénopode -1	Chénopode 0
Brome stérile 45	Brome stérile -4	Brome stérile -8	Brome stérile -10	Brome stérile 0
Matricaire 26	Matricaire -4	Matricaire -3	Matricaire -1	Matricaire 0
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -4	Panic pied-de-coq -5	Panic pied-de-coq -2	Panic pied-de-coq 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Chénopode 0
Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0		Brome stérile 22
Brome stérile 0	Brome stérile -1	Brome stérile 0		Matricaire 17
Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire 0		Panic pied-de-coq 0
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -1	Panic pied-de-coq 0		

Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Fort	Jul-d3 50% Aoû-d2 50%	Sep-d3	200 gr/m²
Chénopode 9	Chénopode -10	Chénopode -3	Chénopode -2	Chénopode 0
Brome stérile 92	Brome stérile -10	Brome stérile -3	Brome stérile -11	Brome stérile 0
Matricaire 26	Matricaire -10	Matricaire -3	Matricaire -1	Matricaire 0
Panic pied-de-coq 1	Panic pied-de-coq -10	Panic pied-de-coq -7	Panic pied-de-coq -3	Panic pied-de-coq 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Oct-d3		Chénopode 0
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -0		Brome stérile 62
Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile -5		Matricaire 10
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire -1		Panic pied-de-coq 0
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0		