

Exploitation :

Bachelet

Parcelle :

Moulin

Type de sol :

Limon

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Brome stérile	9
Renouée liseron	42

Situation initiale :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis Sep-d3 Brome stérile 110 Renouée liseron 1	Étouffement culture Association de cultures : Faible Brome stérile -4 Renouée liseron -4	Interculture Aoû-d3 50% Sep-d2 50% Brome stérile -9 Renouée liseron 0	Date de labour Pas de labour Brome stérile 0 Renouée liseron 0	Densité de semis 200 gr/m ² Brome stérile 0 Renouée liseron 0
Entre rangs 12.5 cm Brome stérile -2 Renouée liseron -2	Variété Non couvrante Brome stérile 0 Renouée liseron 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Brome stérile 0 Renouée liseron 0	Désherbage chimique Nov-d3 Mar-d3	Score annuel Brome stérile 94 Renouée liseron 0

Année 2 - Betteraves

Date de semis Mar-d2 Brome stérile 16 Renouée liseron 58	Étouffement culture Association de cultures : Très faible Brome stérile 0 Renouée liseron 0	Interculture Brome stérile 0 Renouée liseron 0	Date de labour Jan-d2 Brome stérile -6 Renouée liseron -3	Densité de semis 12 gr/m ² Brome stérile 0 Renouée liseron 0
Entre rangs 42 cm Brome stérile 0 Renouée liseron 0	Variété Non couvrante Brome stérile 0 Renouée liseron 0	Désherbage mécanique Bineuse : Jun-d2 Mai-d3 Houe rotative : Herse étrille : Brome stérile 0 Renouée liseron -10	Désherbage chimique Mai-d1 Avr-d2 Avr-d3	Score annuel Brome stérile 10 Renouée liseron 46

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Faible	Aoû-d3 50% Sep-d2 50%	Nov-d1	300 gr/m ²
Brome stérile 21 Renouée liseron 1	Brome stérile -4 Renouée liseron -4	Brome stérile -9 Renouée liseron 0	Brome stérile -8 Renouée liseron -3	Brome stérile 0 Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d2	Brome stérile 0 Renouée liseron 0
Brome stérile -2 Renouée liseron -2	Brome stérile 0 Renouée liseron 0	Brome stérile 0 Renouée liseron 0		

Année 4 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d1	Association de cultures : Très faible	Avr-d2 50%	Jan-d2	12 gr/m ²
Brome stérile 5 Renouée liseron 128	Brome stérile 0 Renouée liseron 0	Brome stérile -1 Renouée liseron -5	Brome stérile -6 Renouée liseron -3	Brome stérile 0 Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d1	Brome stérile 0 Renouée liseron 120
Brome stérile 0 Renouée liseron 0	Brome stérile 0 Renouée liseron 0	Brome stérile 0 Renouée liseron 0		

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Faible	Aoû-d3 50% Sep-d2 50%	Pas de labour	200 gr/m ²
Brome stérile 93 Renouée liseron 1	Brome stérile -4 Renouée liseron -4	Brome stérile -9 Renouée liseron 0	Brome stérile 0 Renouée liseron 0	Brome stérile 0 Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d3 Nov-d3	Brome stérile 78 Renouée liseron 0
Brome stérile -2 Renouée liseron -2	Brome stérile 0 Renouée liseron 0	Brome stérile 0 Renouée liseron 0		

Année 6 - Pomme de terre

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Brome stérile 0 Renouée liseron 0	Jan-d2	12 gr/m ²
Brome stérile 11 Renouée liseron 127	Brome stérile 0 Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Brome stérile -6 Renouée liseron -3	Brome stérile 0 Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d3	Brome stérile 6 Renouée liseron 123
Brome stérile 0 Renouée liseron 0	Brome stérile 0 Renouée liseron 0	Brome stérile 0 Renouée liseron 0		

Année 7 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Sep-d2 50% Aoû-d3 50% Brome stérile -9 Renouée liseron 0	Oct-d2	260 gr/m ²
Brome stérile 71 Renouée liseron 1	Brome stérile -4 Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Brome stérile -11 Renouée liseron -3	Brome stérile 0 Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d3 Mar-d2	Brome stérile 44 Renouée liseron 0
Brome stérile -2 Renouée liseron -2	Brome stérile 0 Renouée liseron 0	Brome stérile 0 Renouée liseron 0		

Année 8 - Lin de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Très faible	Brome stérile 0 Renouée liseron 0	Jan-d2	12 gr/m ²
Brome stérile 15 Renouée liseron 85	Brome stérile 0 Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Brome stérile -6 Renouée liseron -3	Brome stérile 0 Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d2	Brome stérile 9 Renouée liseron 82
Brome stérile 0 Renouée liseron 0	Brome stérile 0 Renouée liseron 0	Brome stérile 0 Renouée liseron 0		