

Scénario : formation 28 juin 2016
 Exploitation : Jean Bernard Fouray
 Parcelle : point zéro
 Type de sol : limons

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	27 (27)
Ray-grass	30 (29)
Folle-avoine	23 (21)

Scénario :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis Aoû-d3	Étouffement culture Association de cultures : Moyen Vulpin -6 Ray-grass -6 Folle-avoine -6	Interculture Aoû-d1 50% Aoû-d2 50% Vulpin -1 Ray-grass -5 Folle-avoine -0	Date de labour Non définie Vulpin 0 Ray-grass 0 Folle-avoine 0	Densité de semis 12 gr/m ² Vulpin 0 Ray-grass 0 Folle-avoine 0
Entre rangs 12.5 cm Vulpin -2 Ray-grass -2 Folle-avoine -2	Variété Non couvrante Vulpin 0 Ray-grass 0 Folle-avoine 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Ray-grass 0 Folle-avoine 0	Désherbage chimique Sep-d1	Score annuel Vulpin 79 Ray-grass 83 Folle-avoine 20

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis Oct-d2	Étouffement culture Association de cultures : Faible Vulpin -4 Ray-grass -4 Folle-avoine -4	Interculture Aoû-d3 50% Sep-d2 50% Vulpin -8 Ray-grass -9 Folle-avoine -3	Date de labour Non définie Vulpin 0 Ray-grass 0 Folle-avoine 0	Densité de semis 175 gr/m ² Vulpin 0 Ray-grass 0 Folle-avoine 0
Entre rangs 12.5 cm Vulpin -2 Ray-grass -2 Folle-avoine -2	Variété Très couvrante Vulpin -2 Ray-grass -2 Folle-avoine -2	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Ray-grass 0 Folle-avoine 0	Désherbage chimique Fév-d3 Oct-d2	Score annuel Vulpin 44 Ray-grass 35 Folle-avoine 16

Année 3 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Très faible	Mar-d1 50%	Nov-d2	12 gr/m ²
Vulpin 38	Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin -2	Vulpin 0
Ray-grass 35	Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass -2	Ray-grass 0
Folle-avoine 90	Folle-avoine 0	Folle-avoine -4	Folle-avoine -2	Folle-avoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d1 Avr-d1 Mar-d2 Avr-d3	Vulpin 34 Ray-grass 32 Folle-avoine 84
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Faible	Vulpin 0 Ray-grass 0 Folle-avoine 0	Pas de labour	200 gr/m ²
Vulpin 14	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 18	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Folle-avoine 15	Folle-avoine -4	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Fév-d3	Vulpin 6 Ray-grass 10 Folle-avoine 7
Vulpin -2	Vulpin -2	Vulpin 0		
Ray-grass -2	Ray-grass -2	Ray-grass 0		
Folle-avoine -2	Folle-avoine -2	Folle-avoine 0		

Année 5 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d1	Association de cultures : Fort	Vulpin 0 Ray-grass 0 Folle-avoine 0	Pas de labour	180 gr/m ²
Vulpin 36	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 33	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Folle-avoine 93	Folle-avoine -10	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d1 Mai-d2	Vulpin 24 Ray-grass 21 Folle-avoine 81
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Folle-avoine -2	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		

Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Sep-d2 50% Aoû-d3 50%	Non définie	190 gr/m ²
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -8	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass -9	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Folle-avoine 26	Folle-avoine -4	Folle-avoine -3	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Fév-d3	Vulpin 44 Ray-grass 35 Folle-avoine 16
Vulpin -2	Vulpin -2	Vulpin 0		
Ray-grass -2	Ray-grass -2	Ray-grass 0		
Folle-avoine -2	Folle-avoine -2	Folle-avoine 0		

Année 7 - Lin de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Très faible	Vulpin 0 Ray-grass 0 Folle-avoine 0	Nov-d3	12 gr/m ²
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Folle-avoine 0	Vulpin -2 Ray-grass -2 Folle-avoine -2	Vulpin 0 Ray-grass 0 Folle-avoine 0
Ray-grass 0	Ray-grass 0			
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0			
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d2 Avr-d3	Vulpin 0 Ray-grass 0 Folle-avoine 0
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Folle-avoine 0		
Ray-grass 0	Ray-grass 0			
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0			

Année 8 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d3	Association de cultures : Faible	Sep-d2 50% Aoû-d3 50%	Non définie	170 gr/m ²
Vulpin 104	Vulpin -4	Vulpin -8	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 84	Ray-grass -4	Ray-grass -9	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Folle-avoine 41	Folle-avoine -4	Folle-avoine -3	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 90 Ray-grass 69 Folle-avoine 32
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Folle-avoine 0		
Ray-grass -2	Ray-grass 0			
Folle-avoine -2	Folle-avoine 0			