

Scénario : RotIni_W_sol2
Exploitation : Puiseux
Parcelle : Rotation initiale
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Ray-grass	48 (54)	
Vulpin	47 (55)	
Gaillet	51 (56)	
Coquelicot	70 (75)	
Brome mou	55 (61)	

Scénario :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Août-d3</p> <p>Ray-grass 96</p> <p>Vulpin 89</p> <p>Gaillet 25</p> <p>Coquelicot 41</p> <p>Brome mou 105</p>	<p>Association de cultures : Moyen</p> <p>Ray-grass -6</p> <p>Vulpin -6</p> <p>Gaillet -6</p> <p>Coquelicot -6</p> <p>Brome mou -6</p>	<p>Août-d3 50% Août-d2 50%</p> <p>Août-d1 50%</p> <p>Ray-grass -9</p> <p>Vulpin -4</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Coquelicot -1</p> <p>Brome mou -6</p>	<p>Pas de labour</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Coquelicot 0</p> <p>Brome mou 0</p>	<p>12 gr/m²</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Coquelicot 0</p> <p>Brome mou 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>12.5 cm</p> <p>Ray-grass -2</p> <p>Vulpin -2</p> <p>Gaillet -2</p> <p>Coquelicot -2</p> <p>Brome mou -2</p>	<p>Non couvrante</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Coquelicot 0</p> <p>Brome mou 0</p>	<p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Coquelicot 0</p> <p>Brome mou 0</p>		<p>Ray-grass 79</p> <p>Vulpin 77</p> <p>Gaillet 17</p> <p>Coquelicot 31</p> <p>Brome mou 91</p>

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Faible	Oct-d1 50% Sep-d3 50%	Oct-d1	190 gr/m²
Ray-grass 69	Ray-grass -4	Ray-grass -14	Ray-grass -9	Ray-grass 0
Vulpin 87	Vulpin -4	Vulpin -16	Vulpin -13	Vulpin 0
Gaillet 95	Gaillet -4	Gaillet -6	Gaillet -11	Gaillet 0
Coquelicot 71	Coquelicot -4	Coquelicot -8	Coquelicot -4	Coquelicot 0
Brome mou 93	Brome mou -4	Brome mou -15	Brome mou -11	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 40
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Vulpin 52
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Gaillet 71
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Coquelicot 53
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Brome mou 62
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0		

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Aoû-d3 50% Sep-d3 50%	Oct-d1	220 gr/m²
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass -9	Ray-grass -9	Ray-grass 0
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -8	Vulpin -13	Vulpin 0
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet -3	Gaillet -11	Gaillet 0
Coquelicot 64	Coquelicot -4	Coquelicot -4	Coquelicot -4	Coquelicot 0
Brome mou 71	Brome mou -4	Brome mou -8	Brome mou -11	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 28
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Vulpin 33
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Gaillet 78
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Coquelicot 51
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Brome mou 46
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0		