

Scénario : RotB_Lev2d_2bis-a
Exploitation : Puisieux
Parcelle : Rotation4 (BET+Binage)
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Ray-grass	11 (38)	
Vulpin	6 (36)	
Gaillet	25 (43)	
Coquelicot	32 (75)	
Brome mou	7 (40)	

Scénario :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Août-d2</p> <p>Ray-grass 88</p> <p>Vulpin 68</p> <p>Gaillet 13</p> <p>Coquelicot 28</p> <p>Brome mou 89</p>	<p>Association de cultures : Moyen</p> <p>Ray-grass -6</p> <p>Vulpin -6</p> <p>Gaillet -6</p> <p>Coquelicot -6</p> <p>Brome mou -6</p>	<p>Jul-d2 50% Sep-d3 50%</p> <p>Août-d2 50%</p> <p>Ray-grass -8</p> <p>Vulpin -7</p> <p>Gaillet -3</p> <p>Coquelicot -4</p> <p>Brome mou -7</p>	<p>Pas de labour</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Coquelicot 0</p> <p>Brome mou 0</p>	<p>12 gr/m²</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Coquelicot 0</p> <p>Brome mou 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>12.5 cm</p> <p>Ray-grass -2</p> <p>Vulpin -2</p> <p>Gaillet -2</p> <p>Coquelicot -2</p> <p>Brome mou -2</p>	<p>Non couvrante</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Coquelicot 0</p> <p>Brome mou 0</p>	<p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Coquelicot 0</p> <p>Brome mou 0</p>		<p>Ray-grass 72</p> <p>Vulpin 53</p> <p>Gaillet 2</p> <p>Coquelicot 17</p> <p>Brome mou 74</p>

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Faible	Aoû-d2 50% Sep-d2 50% Oct-d1 50%	Pas de labour	180 gr/m²
Ray-grass 7	Ray-grass -4	Ray-grass -13	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 8	Vulpin -4	Vulpin -13	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 75	Gaillet -4	Gaillet -5	Gaillet 0	Gaillet 0
Coquelicot 36	Coquelicot -4	Coquelicot -6	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Brome mou 6	Brome mou -4	Brome mou -13	Brome mou 0	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 0
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Vulpin 0
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Gaillet 64
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Coquelicot 24
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Brome mou 0
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0		

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d3	Association de cultures : Faible	Aoû-d3 50%	Oct-d1	220 gr/m²
Ray-grass 4	Ray-grass -4	Ray-grass -4	Ray-grass -12	Ray-grass 0
Vulpin 4	Vulpin -4	Vulpin -3	Vulpin -17	Vulpin 0
Gaillet 66	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet -15	Gaillet 0
Coquelicot 27	Coquelicot -4	Coquelicot -1	Coquelicot -6	Coquelicot 0
Brome mou 2	Brome mou -4	Brome mou -3	Brome mou -14	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 0
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Vulpin 0
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Gaillet 45
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Coquelicot 14
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Brome mou 0
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0		

Année 4 - Betteraves

Date de semis <div>Avr-d1</div> <div>Ray-grass 27</div> <div>Vulpin 28</div> <div>Gaillet 3</div> <div>Coquelicot 44</div> <div>Brome mou 14</div>	Étouffement culture Association de cultures : Très faible <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Coquelicot 0</div> <div>Brome mou 0</div>	Interculture <div>Oct-d2 50%</div> <div>Ray-grass -4</div> <div>Vulpin -5</div> <div>Gaillet -5</div> <div>Coquelicot -4</div> <div>Brome mou -5</div>	Date de labour <div>Nov-d3</div> <div>Ray-grass -6</div> <div>Vulpin -9</div> <div>Gaillet -15</div> <div>Coquelicot -4</div> <div>Brome mou -7</div>	Densité de semis 12 gr/m² <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Coquelicot 0</div> <div>Brome mou 0</div>
Entre rangs 42 cm <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Coquelicot 0</div> <div>Brome mou 0</div>	Variété Non couvrante <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Coquelicot 0</div> <div>Brome mou 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : <div>Mai-d2</div> <div>Avr-d3</div> Houe rotative : Herse étrille : <div>Ray-grass -2</div> <div>Vulpin -2</div> <div>Gaillet -0</div> <div>Coquelicot -3</div> <div>Brome mou -2</div>	Désherbage chimique <div>Mai-d2</div> <div>Mai-d1</div> <div>Avr-d2</div> <div>Avr-d3</div>	Score annuel <div>Ray-grass 15</div> <div>Vulpin 13</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Coquelicot 33</div> <div>Brome mou 0</div>

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis <div>Nov-d3</div> <div>Ray-grass 4</div> <div>Vulpin 4</div> <div>Gaillet 66</div> <div>Coquelicot 27</div> <div>Brome mou 2</div>	Étouffement culture Association de cultures : Faible <div>Ray-grass -4</div> <div>Vulpin -4</div> <div>Gaillet -4</div> <div>Coquelicot -4</div> <div>Brome mou -4</div>	Interculture <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Coquelicot 0</div> <div>Brome mou 0</div>	Date de labour <div>Oct-d1</div> <div>Ray-grass -12</div> <div>Vulpin -17</div> <div>Gaillet -15</div> <div>Coquelicot -6</div> <div>Brome mou -14</div>	Densité de semis 200 gr/m² <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Coquelicot 0</div> <div>Brome mou 0</div>
Entre rangs 12.5 cm <div>Ray-grass -2</div> <div>Vulpin -2</div> <div>Gaillet -2</div> <div>Coquelicot -2</div> <div>Brome mou -2</div>	Variété Non couvrante <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Coquelicot 0</div> <div>Brome mou 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Coquelicot 0</div> <div>Brome mou 0</div>	Désherbage chimique 	Score annuel <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Gaillet 45</div> <div>Coquelicot 15</div> <div>Brome mou 0</div>

Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis

Nov-d3

Ray-grass	4
Vulpin	4
Gaillet	66
Coquelicot	27
Brome mou	2

Étouffement culture

Association de cultures :
Faible

Ray-grass	-4
Vulpin	-4
Gaillet	-4
Coquelicot	-4
Brome mou	-4

Interculture

Aoû-d3 50%

Ray-grass	-4
Vulpin	-3
Gaillet	0
Coquelicot	-1
Brome mou	-3

Date de labour

Oct-d1

Ray-grass	-12
Vulpin	-17
Gaillet	-15
Coquelicot	-6
Brome mou	-14

Densité de semis

220 gr/m²

Ray-grass	0
Vulpin	0
Gaillet	0
Coquelicot	0
Brome mou	0

Entre rangs

12.5 cm

Ray-grass	-2
Vulpin	-2
Gaillet	-2
Coquelicot	-2
Brome mou	-2

Variété

Non couvrante

Ray-grass	0
Vulpin	0
Gaillet	0
Coquelicot	0
Brome mou	0

Désherbage mécanique

Bineuse :
Houe rotative :
Herse étrille :

Ray-grass	0
Vulpin	0
Gaillet	0
Coquelicot	0
Brome mou	0

Désherbage chimique

Score annuel

Ray-grass	0
Vulpin	0
Gaillet	45
Coquelicot	14
Brome mou	0