

Scénario : RotB_Lev5_2bis-a
Exploitation : Puisieux
Parcelle : Rotation4 (BET+Binage)
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Ray-grass	30 (38)	
Vulpin	25 (36)	
Gaillet	26 (43)	
Coquelicot	63 (75)	
Brome mou	31 (40)	

Scénario :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Aoû-d2</p> <p>Ray-grass 88</p> <p>Vulpin 68</p> <p>Gaillet 13</p> <p>Coquelicot 28</p> <p>Brome mou 89</p>	<p>Association de cultures : Moyen</p> <p>Ray-grass -6</p> <p>Vulpin -6</p> <p>Gaillet -6</p> <p>Coquelicot -6</p> <p>Brome mou -6</p>	<p>Sep-d3 50% Aoû-d2 50%</p> <p>Jul-d2 50%</p> <p>Ray-grass -8</p> <p>Vulpin -7</p> <p>Gaillet -3</p> <p>Coquelicot -4</p> <p>Brome mou -7</p>	<p>Pas de labour</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Coquelicot 0</p> <p>Brome mou 0</p>	<p>12 gr/m²</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Coquelicot 0</p> <p>Brome mou 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>12.5 cm</p> <p>Ray-grass -2</p> <p>Vulpin -2</p> <p>Gaillet -2</p> <p>Coquelicot -2</p> <p>Brome mou -2</p>	<p>Non couvrante</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Coquelicot 0</p> <p>Brome mou 0</p>	<p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Coquelicot 0</p> <p>Brome mou 0</p>		<p>Ray-grass 72</p> <p>Vulpin 53</p> <p>Gaillet 2</p> <p>Coquelicot 17</p> <p>Brome mou 74</p>

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Faible	Aoû-d2 50% Oct-d1 50%	Pas de labour	180 gr/m²
Ray-grass 69	Ray-grass -4	Ray-grass -13	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 87	Vulpin -4	Vulpin -13	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 95	Gaillet -4	Gaillet -5	Gaillet 0	Gaillet 0
Coquelicot 71	Coquelicot -4	Coquelicot -6	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Brome mou 93	Brome mou -4	Brome mou -13	Brome mou 0	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 50
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Vulpin 68
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Gaillet 84
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Coquelicot 59
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Brome mou 75
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0		

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Aoû-d3 50%	Oct-d1	220 gr/m²
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass -4	Ray-grass -12	Ray-grass 0
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -3	Vulpin -17	Vulpin 0
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet -15	Gaillet 0
Coquelicot 64	Coquelicot -4	Coquelicot -1	Coquelicot -6	Coquelicot 0
Brome mou 71	Brome mou -4	Brome mou -3	Brome mou -14	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 30
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Vulpin 34
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Gaillet 77
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Coquelicot 52
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Brome mou 47
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0		

Année 4 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1	Association de cultures : Très faible	Oct-d2 50%	Nov-d3	12 gr/m²
Ray-grass 27	Ray-grass 0	Ray-grass -4	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Vulpin 28	Vulpin 0	Vulpin -5	Vulpin -9	Vulpin 0
Gaillet 3	Gaillet 0	Gaillet -5	Gaillet -15	Gaillet 0
Coquelicot 44	Coquelicot 0	Coquelicot -4	Coquelicot -4	Coquelicot 0
Brome mou 14	Brome mou 0	Brome mou -5	Brome mou -7	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Mai-d2 Avr-d3	Mai-d2 Mai-d1 Avr-d2 Avr-d3	Ray-grass 15
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -2		Vulpin 13
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -2		Gaillet 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -0		Coquelicot 33
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot -3		Brome mou 0
Brome mou 0	Brome mou 0	Brome mou -2		

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible		Oct-d1	200 gr/m²
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass -12	Ray-grass 0
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin -17	Vulpin 0
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet -15	Gaillet 0
Coquelicot 64	Coquelicot -4	Coquelicot 0	Coquelicot -6	Coquelicot 0
Brome mou 71	Brome mou -4	Brome mou 0	Brome mou -14	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 34
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Vulpin 36
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Gaillet 77
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Coquelicot 53
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Brome mou 50
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0		

Année 6 - Orge de printemps

Date de semis

Fév-d2

Ray-grass	21
Vulpin	24
Gaillet	18
Coquelicot	32
Brome mou	8

Étouffement culture

Association de cultures :
Fort

Ray-grass	-10
Vulpin	-10
Gaillet	-10
Coquelicot	-10
Brome mou	-10

Interculture

Sep-d3 50%

Ray-grass	-5
Vulpin	-6
Gaillet	-3
Coquelicot	-3
Brome mou	-5

Date de labour

Fév-d2

Ray-grass	-7
Vulpin	-10
Gaillet	-10
Coquelicot	-3
Brome mou	-8

Densité de semis

220 gr/m²

Ray-grass	0
Vulpin	0
Gaillet	0
Coquelicot	0
Brome mou	0

Entre rangs

12.5 cm

Ray-grass	-2
Vulpin	-2
Gaillet	-2
Coquelicot	-2
Brome mou	-2

Variété

Non couvrante

Ray-grass	0
Vulpin	0
Gaillet	0
Coquelicot	0
Brome mou	0

Désherbage mécanique

Bineuse :
Houe rotative :
Herse étrille :

Ray-grass	0
Vulpin	0
Gaillet	0
Coquelicot	0
Brome mou	0

Désherbage chimique

Score annuel

Ray-grass	0
Vulpin	0
Gaillet	0
Coquelicot	14
Brome mou	0