






Exploitation :
Parcelle :
Type de sol :

1- ROTAB : La Hourre
ZR8
Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Coquelicot	29 
Laiteron rude	59 
Mouron	70 
Renouée des oiseaux	42 
Chénopode	45 

Situation initiale :

Année 1 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Très faible	Avr-d3 50%	Nov-d1	12 gr/m²
Coquelicot 29	Coquelicot 0	Coquelicot -2	Coquelicot -2	Coquelicot 0
Laiteron rude 61	Laiteron rude 0	Laiteron rude -3	Laiteron rude -2	Laiteron rude 0
Mouron 94	Mouron 0	Mouron -4	Mouron -1	Mouron 0
Renouée des oiseaux 92	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -6	Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0
Chénopode 57	Chénopode 0	Chénopode -3	Chénopode -1	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Mai-d3 Jun-d2 Houe rotative : Herse étrille :		
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot -1		Coquelicot 23
Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude -6		Laiteron rude 50
Mouron 0	Mouron 0	Mouron -8		Mouron 80
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -4		Renouée des oiseaux 80
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -4		Chénopode 49

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis <div>Déc-d2</div> <div>Coquelicot 14</div> <div>Laiteron rude 13</div> <div>Mouron 2</div> <div>Renouée des oiseaux 9</div> <div>Chénopode 7</div>	Étouffement culture Association de cultures : Faible <div>Coquelicot -4</div> <div>Laiteron rude -4</div> <div>Mouron -4</div> <div>Renouée des oiseaux -4</div> <div>Chénopode -4</div>	Interculture <div>Coquelicot 0</div> <div>Laiteron rude 0</div> <div>Mouron 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div> <div>Chénopode 0</div>	Date de labour <div>Oct-d2</div> <div>Coquelicot -3</div> <div>Laiteron rude -2</div> <div>Mouron -1</div> <div>Renouée des oiseaux -2</div> <div>Chénopode -1</div>	Densité de semis 12 gr/m² <div>Coquelicot 0</div> <div>Laiteron rude 0</div> <div>Mouron 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div> <div>Chénopode 0</div>
Entre rangs 42 cm <div>Coquelicot 0</div> <div>Laiteron rude 0</div> <div>Mouron 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div> <div>Chénopode 0</div>	Variété Non couvrante <div>Coquelicot 0</div> <div>Laiteron rude 0</div> <div>Mouron 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div> <div>Chénopode 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Mar-d3</div> <div>Avr-d1</div> <div>Mar-d2</div> <div>Coquelicot -7</div> <div>Laiteron rude -5</div> <div>Mouron -6</div> <div>Renouée des oiseaux -17</div> <div>Chénopode -9</div>	Désherbage chimique	Score annuel <div>Coquelicot 0</div> <div>Laiteron rude 3</div> <div>Mouron 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div> <div>Chénopode 0</div>

Année 3 - Autre culture de print.

Date de semis <div>Mai-d2</div> <div>Coquelicot 15</div> <div>Laiteron rude 59</div> <div>Mouron 86</div> <div>Renouée des oiseaux 48</div> <div>Chénopode 47</div>	Étouffement culture Association de cultures : Très faible <div>Coquelicot 0</div> <div>Laiteron rude 0</div> <div>Mouron 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div> <div>Chénopode 0</div>	Interculture <div>Mar-d2 50%</div> <div>Mai-d2 50%</div> <div>Août-d1 50%</div> <div>Coquelicot -4</div> <div>Laiteron rude -5</div> <div>Mouron -7</div> <div>Renouée des oiseaux -9</div> <div>Chénopode -7</div>	Date de labour <div>Sep-d1</div> <div>Coquelicot -2</div> <div>Laiteron rude -2</div> <div>Mouron -1</div> <div>Renouée des oiseaux -2</div> <div>Chénopode -2</div>	Densité de semis 12 gr/m² <div>Coquelicot 0</div> <div>Laiteron rude 0</div> <div>Mouron 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div> <div>Chénopode 0</div>
Entre rangs 42 cm <div>Coquelicot 0</div> <div>Laiteron rude 0</div> <div>Mouron 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div> <div>Chénopode 0</div>	Variété Non couvrante <div>Coquelicot 0</div> <div>Laiteron rude 0</div> <div>Mouron 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div> <div>Chénopode 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : <div>Jun-d2</div> Houe rotative : Herse étrille : <div>Coquelicot -0</div> <div>Laiteron rude -3</div> <div>Mouron -3</div> <div>Renouée des oiseaux -1</div> <div>Chénopode -2</div>	Désherbage chimique	Score annuel <div>Coquelicot 9</div> <div>Laiteron rude 50</div> <div>Mouron 73</div> <div>Renouée des oiseaux 36</div> <div>Chénopode 36</div>

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Faible	Oct-d2 50%	Pas de labour	12 gr/m²
Coquelicot 46	Coquelicot -4	Coquelicot -4	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Laiteron rude 26	Laiteron rude -4	Laiteron rude -1	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0
Mouron 2	Mouron -4	Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Chénopode 6	Chénopode -4	Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mar-d1		
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot -2		Coquelicot 36
Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude -1		Laiteron rude 20
Mouron 0	Mouron 0	Mouron -1		Mouron 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -3		Renouée des oiseaux 2
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -2		Chénopode 0

Année 5 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d1	Association de cultures : Très faible		Oct-d2	12 gr/m²
Coquelicot 21	Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot -3	Coquelicot 0
Laiteron rude 60	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude -2	Laiteron rude 0
Mouron 92	Mouron 0	Mouron 0	Mouron -1	Mouron 0
Renouée des oiseaux 69	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0
Chénopode 52	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Jul-d1 Houe rotative : Herse étrille : Jun-d2		
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot -0		Coquelicot 18
Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude -2		Laiteron rude 56
Mouron 0	Mouron 0	Mouron -3		Mouron 88
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -0		Renouée des oiseaux 67
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -2		Chénopode 49

Année 6 - Féverole d'hiver

Date de semis

Nov-d3

Coquelicot	21
Laiteron rude	16
Mouron	0
Renouée des oiseaux	0
Chénopode	0

Étouffement culture

Association de cultures :
Très faible

Coquelicot	0
Laiteron rude	0
Mouron	0
Renouée des oiseaux	0
Chénopode	0

Interculture

Oct-d3 50% Nov-d1 50%
Nov-d3 50%

Coquelicot	-8
Laiteron rude	-4
Mouron	0
Renouée des oiseaux	0
Chénopode	-0

Date de labour

Pas de labour

Coquelicot	0
Laiteron rude	0
Mouron	0
Renouée des oiseaux	0
Chénopode	0

Densité de semis

12 gr/m²

Coquelicot	0
Laiteron rude	0
Mouron	0
Renouée des oiseaux	0
Chénopode	0

Entre rangs

42 cm

Coquelicot	0
Laiteron rude	0
Mouron	0
Renouée des oiseaux	0
Chénopode	0

Variété

Non couvrante

Coquelicot	0
Laiteron rude	0
Mouron	0
Renouée des oiseaux	0
Chénopode	0

Désherbage mécanique

Bineuse :

Avr-d2

Houe rotative :

Herse étrille :

Jan-d2

Coquelicot	-3
Laiteron rude	-3
Mouron	-4
Renouée des oiseaux	-7
Chénopode	-3

Désherbage chimique

Score annuel

Coquelicot	11
Laiteron rude	10
Mouron	0
Renouée des oiseaux	0
Chénopode	0