

Exploitation :
Parcelle :
Type de sol :

1- ROTAB : Thorigné
Rotation 3
Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Laiteron rude	15	
Matricaire	9	
Mouron	0	
Coquelicot	27	
Folle-avoine	0	

Situation initiale :

Année 1 - Féverole d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Très faible	Oct-d2 50% Oct-d3 50%	Oct-d3	12 gr/m²
Laiteron rude 20	Laiteron rude 0	Laiteron rude -3	Laiteron rude -4	Laiteron rude 0
Matricaire 15	Matricaire 0	Matricaire -3	Matricaire -2	Matricaire 0
Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0	Mouron -2	Mouron 0
Coquelicot 31	Coquelicot 0	Coquelicot -7	Coquelicot -5	Coquelicot 0
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine -2	Folle-avoine -8	Folle-avoine 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0		Laiteron rude 14
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire 10
Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0		Mouron 0
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 19
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Folle-avoine 0

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d3	Association de cultures : Faible	Sep-d3 50% Aoû-d2 50% Sep-d1 50%	Nov-d3	12 gr/m²
Laiteron rude 19	Laiteron rude -4	Laiteron rude -3	Laiteron rude -3	Laiteron rude 0
Matricaire 18	Matricaire -4	Matricaire -4	Matricaire -2	Matricaire 0
Mouron 2	Mouron -4	Mouron -2	Mouron -2	Mouron 0
Coquelicot 27	Coquelicot -4	Coquelicot -5	Coquelicot -4	Coquelicot 0
Folle-avoine 13	Folle-avoine -4	Folle-avoine -4	Folle-avoine -7	Folle-avoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mar-d1 Mar-d3 Avr-d2		Laiteron rude 4
Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude -5		Matricaire 1
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire -7		Mouron 0
Mouron 0	Mouron 0	Mouron -6		Coquelicot 7
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot -7		Folle-avoine 0
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine -13		

Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Fort	Sep-d2 50%	Oct-d3	12 gr/m²
Laiteron rude 26	Laiteron rude -10	Laiteron rude -1	Laiteron rude -4	Laiteron rude 0
Matricaire 20	Matricaire -10	Matricaire -1	Matricaire -2	Matricaire 0
Mouron 0	Mouron -10	Mouron -0	Mouron -2	Mouron 0
Coquelicot 50	Coquelicot -10	Coquelicot -2	Coquelicot -5	Coquelicot 0
Folle-avoine 7	Folle-avoine -10	Folle-avoine -2	Folle-avoine -8	Folle-avoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Fév-d3 Mar-d1 Mar-d3 Nov-d3		Laiteron rude 7
Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude -4		Matricaire 0
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire -7		Mouron 0
Mouron 0	Mouron 0	Mouron -3		Coquelicot 25
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot -7		Folle-avoine 0
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine -13		