

Exploitation : 1- ROTAB : Corbas
Parcelle : D2
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Ambroisie à feuilles d'armoise	73	
Chénopode	57	
Laiteron rude	69	
Panic pied-de-coq	35	
Ray-grass	0	

Situation initiale :

Année 1 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Avr-d2</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise 96</p> <p>Chénopode 68</p> <p>Laiteron rude 64</p> <p>Panic pied-de-coq 36</p> <p>Ray-grass 19</p>	<p>Association de cultures : Très faible</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Laiteron rude 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p> <p>Ray-grass 0</p>	<p>Aoû-d1 50% Aoû-d2 50%</p> <p>Mar-d2 50% Avr-d1 50%</p> <p>Avr-d2 50%</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise -10</p> <p>Chénopode -13</p> <p>Laiteron rude -7</p> <p>Panic pied-de-coq -7</p> <p>Ray-grass -10</p>	<p>Jan-d2</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise -2</p> <p>Chénopode -2</p> <p>Laiteron rude -3</p> <p>Panic pied-de-coq -5</p> <p>Ray-grass -6</p>	<p>12 gr/m²</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Laiteron rude 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p> <p>Ray-grass 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>42 cm</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise -2</p> <p>Chénopode -2</p> <p>Laiteron rude -2</p> <p>Panic pied-de-coq -2</p> <p>Ray-grass -2</p>	<p>Non couvrante</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Laiteron rude 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p> <p>Ray-grass 0</p>	<p>Bineuse : Mar-d1 Mai-d2 Mai-d3</p> <p>Houe rotative : Jun-d2</p> <p>Herse étrille :</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise -13</p> <p>Chénopode -7</p> <p>Laiteron rude -9</p> <p>Panic pied-de-coq -11</p> <p>Ray-grass -0</p>		<p>Ambroisie à feuilles d'armoise 69</p> <p>Chénopode 44</p> <p>Laiteron rude 44</p> <p>Panic pied-de-coq 12</p> <p>Ray-grass 1</p>

Année 2 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d2	Association de cultures : Très faible	Oct-d3 50% Avr-d2 50%	Jan-d1	12 gr/m²
Ambroisie à feuilles d'armoise 91	Ambroisie à feuilles d'armoise 0	Ambroisie à feuilles d'armoise -9	Ambroisie à feuilles d'armoise -2	Ambroisie à feuilles d'armoise 0
Chénopode 47	Chénopode 0	Chénopode -9	Chénopode -2	Chénopode 0
Laiteron rude 59	Laiteron rude 0	Laiteron rude -8	Laiteron rude -3	Laiteron rude 0
Panic pied-de-coq 82	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -2	Panic pied-de-coq -5	Panic pied-de-coq 0
Ray-grass 2	Ray-grass 0	Ray-grass -7	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Mai-d3 Jun-d1 Jun-d2		Ambroisie à feuilles d'armoise 66
Ambroisie à feuilles d'armoise 0	Ambroisie à feuilles d'armoise 0	Ambroisie à feuilles d'armoise -13		Chénopode 29
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -6		Laiteron rude 40
Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude -8		Panic pied-de-coq 62
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -14		Ray-grass 0
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		